

表 1063 糖尿病の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

Non-HDL-C濃度	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	1,229 (37.9)	2,018 (62.1)	3,247 (100.0)	291		3,538
50～ (%)	6,470 (39.5)	9,894 (60.5)	16,364 (100.0)	1,607		17,971
70～ (%)	16,230 (44.4)	20,350 (55.6)	36,580 (100.0)	3,759		40,339
90～ (%)	20,997 (48.3)	22,514 (51.7)	43,511 (100.0)	4,787		48,298
110～ (%)	18,026 (50.9)	17,403 (49.1)	35,429 (100.0)	3,960		39,389
130～ (%)	11,299 (51.6)	10,580 (48.4)	21,879 (100.0)	2,479		24,358
150～ (%)	5,751 (50.8)	5,565 (49.2)	11,316 (100.0)	1,287		12,603
170～ (%)	2,500 (50.5)	2,450 (49.5)	4,950 (100.0)	574		5,524
190～ (%)	922 (47.2)	1,033 (52.8)	1,955 (100.0)	208		2,163
210～ (%)	608 (46.5)	699 (53.5)	1,307 (100.0)	117		1,424
合計 (%)	84,032 (47.6)	92,506 (52.4)	176,538 (100.0)	19,069		195,607
記載なし (%)	41,743 (42.1)	57,496 (57.9)	99,239 (100.0)	24,263		123,502
総計 (%)	125,775 (45.6)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109
平均	109.86	105.71	107.69	108.90		107.80
標準偏差	33.19	34.27	33.83	33.12		33.76

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3234##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査