

表 1065 糖尿病の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別 (透析患者全体)

透析前 拡張期血圧	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	35 (41.2)	50 (58.8)	85 (100.0)	8		93
20～ (%)	468 (52.5)	423 (47.5)	891 (100.0)	107		998
40～ (%)	9,969 (45.5)	11,947 (54.5)	21,916 (100.0)	2,261		24,177
60～ (%)	53,945 (46.2)	62,863 (53.8)	116,808 (100.0)	12,481		129,289
80～ (%)	29,974 (48.9)	31,306 (51.1)	61,280 (100.0)	6,765		68,045
90～ (%)	16,570 (49.7)	16,771 (50.3)	33,341 (100.0)	3,603		36,944
100～ (%)	7,895 (48.3)	8,444 (51.7)	16,339 (100.0)	1,742		18,081
120～ (%)	516 (46.4)	597 (53.6)	1,113 (100.0)	124		1,237
140～ (%)	40 (54.1)	34 (45.9)	74 (100.0)	13		87
合計 (%)	119,412 (47.4)	132,435 (52.6)	251,847 (100.0)	27,104		278,951
記載なし (%)	6,363 (26.6)	17,567 (73.4)	23,930 (100.0)	16,228		40,158
総計 (%)	125,775 (45.6)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109
平均	78.09	77.39	77.72	77.85		77.73
標準偏差	14.51	14.48	14.50	14.51		14.50

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3236##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査