

表 1066 治療方法(新分類)併用の状況別(透析患者全体、糖尿病あり患者)

併用の状況	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	ハイオフィルトレーション	IHDF	血液濾過	血液吸着透析(リクセル等使用)	在宅血液透析	腹膜透析(CAPD)	腹膜透析(APD)	腹膜透析(CCPD)	合計	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)	113,334 (99.9)	1,848 (99.9)	25,398 (99.9)	29 (100.0)	107 (100.0)	5,362 (99.9)	10 (100.0)	127 (100.0)	134 (99.3)				146,349 (97.6)		146,349 (97.6)
PD単独 (%)										1,695 (84.2)	872 (80.5)	254 (65.0)	2,821 (1.9)		2,821 (1.9)
HD(F)単独.PDカテあり (%)	58 (0.1)	1 (0.1)	11 (0.0)			2 (0.0)			1 (0.7)				73 (0.0)		73 (0.0)
PD.HD併用週1HD(F) (%)										276 (13.7)	199 (18.4)	128 (32.7)	603 (0.4)		603 (0.4)
PD.HD併用週2HD(F) (%)	14 (0.0)		3 (0.0)			2 (0.0)				31 (1.5)	8 (0.7)	6 (1.5)	64 (0.0)		64 (0.0)
PD.HD併用週3HD(F) (%)	17 (0.0)												17 (0.0)		17 (0.0)
PD.HD併用週4HD(F) (%)															
PD.HD併用その他 (%)	4 (0.0)		1 (0.0)							11 (0.5)	4 (0.4)	3 (0.8)	23 (0.0)		23 (0.0)
合計 (%)	113,427 (100.0)	1,849 (100.0)	25,413 (100.0)	29 (100.0)	107 (100.0)	5,366 (100.0)	10 (100.0)	127 (100.0)	135 (100.0)	2,013 (100.0)	1,083 (100.0)	391 (100.0)	149,950 (100.0)		149,950 (100.0)
不明		6	1							2	1		10		10
記載なし	31	1			1					8	1		42		42
総計	113,458	1,856	25,414	29	108	5,366	10	127	135	2,023	1,085	391	150,002		150,002

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

#D3310##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査