

表 1080 透析前アルブミン濃度(g/dL) 性別 (透析患者全体)

性別	1.5未満	1.5~	2.0~	2.5~	3.0~	3.5~	4.0~	4.5~	5.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	125 (0.1)	694 (0.4)	2,853 (1.5)	10,890 (5.9)	47,258 (25.6)	90,462 (49.1)	30,363 (16.5)	1,659 (0.9)	100 (0.1)	184,404 (100.0)	21,519	205,923	3.57	0.44
女性 (%)	76 (0.1)	425 (0.4)	1,959 (1.9)	7,213 (7.1)	29,410 (29.0)	48,965 (48.3)	12,798 (12.6)	457 (0.5)	44 (0.0)	101,347 (100.0)	11,838	113,185	3.51	0.44
合計 (%)	201 (0.1)	1,119 (0.4)	4,812 (1.7)	18,103 (6.3)	76,668 (26.8)	139,427 (48.8)	43,161 (15.1)	2,116 (0.7)	144 (0.1)	285,751 (100.0)	33,357	319,108	3.55	0.44
記載なし (%)											1	1		
総計 (%)	201 (0.1)	1,119 (0.4)	4,812 (1.7)	18,103 (6.3)	76,668 (26.8)	139,427 (48.8)	43,161 (15.1)	2,116 (0.7)	144 (0.1)	285,751 (100.0)	33,358	319,109	3.55	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3813##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査