

表 1083 透析前アルブミン濃度(g/dL) 原疾患別 (透析患者全体)

原疾患	1.5未満	1.5~	2.0~	2.5~	3.0~	3.5~	4.0~	4.5~	5.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性系球体腎炎	45 (%)	231 (0.3)	1,024 (1.2)	4,297 (5.2)	21,226 (25.8)	41,486 (50.4)	13,294 (16.2)	646 (0.8)	44 (0.1)	82,293 (100.0)	9,490	91,783	3.58	0.42
慢性腎盂腎炎	1 (%)	10 (0.0)	48 (0.4)	176 (1.8)	720 (6.7)	1,259 (27.5)	386 (48.0)	21 (14.7)	1 (0.8)	2,622 (0.0)	274	2,896	3.54	0.44
急速進行性系球体腎炎		16 (%)	56 (0.7)	216 (2.5)	779 (9.6)	925 (34.6)	251 (41.0)	9 (11.1)	2 (0.4)	2,254 (0.1)	284	2,538	3.44	0.47
妊娠腎/妊娠中毒症		2 (%)	9 (0.1)	61 (0.7)	361 (4.5)	713 (26.6)	200 (52.6)	10 (14.7)	10 (0.7)	1,356 (100.0)	127	1,483	3.59	0.38
その他の分類不能の腎炎	2 (%)	2 (0.2)	17 (0.2)	77 (1.3)	304 (5.8)	632 (23.0)	256 (47.9)	29 (19.4)	1 (2.2)	1,320 (0.1)	134	1,454	3.62	0.45
多発性囊胞腎	5 (%)	26 (0.0)	130 (0.3)	542 (1.3)	2,901 (5.2)	5,248 (27.9)	1,469 (50.5)	74 (14.1)	4 (0.7)	10,399 (0.0)	1,072	11,471	3.56	0.41
腎硬化症	23 (%)	109 (0.1)	491 (0.4)	2,147 (1.7)	8,656 (7.6)	13,335 (30.5)	3,445 (47.0)	162 (12.1)	10 (0.6)	28,378 (0.0)	3,272	31,650	3.50	0.44
悪性高血圧	1 (%)	6 (0.0)	29 (0.3)	101 (1.2)	553 (4.2)	1,210 (23.1)	463 (50.5)	31 (19.3)	2 (1.3)	2,396 (0.1)	325	2,721	3.63	0.43
糖尿病性腎症	83 (%)	481 (0.1)	2,055 (0.4)	7,159 (1.9)	29,035 (6.5)	54,248 (26.2)	17,035 (48.9)	757 (15.4)	56 (0.7)	110,909 (0.1)	12,748	123,657	3.55	0.45
SLE腎炎	2 (%)	4 (0.1)	31 (0.2)	171 (1.6)	649 (8.6)	896 (32.8)	215 (45.3)	10 (10.9)	10 (0.5)	1,978 (100.0)	244	2,222	3.48	0.43
アミロイド腎	1 (%)	6 (0.3)	17 (1.5)	57 (4.4)	123 (14.6)	139 (31.5)	40 (35.6)	7 (10.3)	7 (1.8)	390 (100.0)	48	438	3.36	0.55
痛風腎		1 (%)	11 (0.1)	44 (1.2)	226 (4.6)	501 (23.8)	156 (52.8)	10 (16.4)	10 (1.1)	949 (100.0)	107	1,056	3.61	0.40
先天性代謝異常による腎不全		4 (%)	6 (1.6)	13 (2.3)	51 (5.1)	112 (19.8)	66 (43.6)	5 (25.7)	5 (1.9)	257 (100.0)	24	281	3.63	0.55
腎・尿路結核		1 (%)	3 (0.7)	15 (2.0)	41 (10.1)	73 (27.5)	16 (49.0)	16 (10.7)		149 (100.0)	19	168	3.46	0.44
腎・尿路結石		2 (%)	10 (0.4)	32 (1.9)	150 (6.2)	254 (29.2)	64 (49.4)	1 (12.5)	1 (0.2)	514 (100.0)	64	578	3.52	0.43
腎・尿路腫瘍		4 (%)	16 (0.5)	64 (1.9)	225 (7.5)	456 (26.2)	89 (53.1)	4 (10.4)	1 (0.5)	859 (0.1)	100	959	3.52	0.43
閉塞性尿路障害		2 (%)	17 (0.3)	39 (2.6)	164 (5.9)	309 (24.9)	123 (46.9)	5 (18.7)	5 (0.8)	659 (100.0)	84	743	3.58	0.46
骨髄腫	2 (%)	2 (0.7)	15 (0.7)	33 (5.3)	95 (11.6)	105 (33.3)	28 (36.8)	5 (9.8)	5 (1.8)	285 (100.0)	38	323	3.37	0.55
腎形成不全		1 (%)	3 (0.2)	15 (0.5)	99 (2.5)	281 (16.7)	182 (47.3)	12 (30.6)	1 (2.0)	594 (0.2)	70	664	3.75	0.42
不明	24 (%)	149 (0.1)	611 (0.5)	2,190 (2.2)	7,839 (7.9)	12,856 (28.3)	3,842 (46.3)	222 (13.8)	13 (0.8)	27,746 (0.0)	3,666	31,412	3.51	0.46
再導入	1 (%)	4 (0.1)	18 (0.2)	76 (0.9)	429 (4.0)	1,013 (22.3)	360 (52.7)	18 (18.7)	2 (0.9)	1,921 (0.1)	253	2,174	3.64	0.41
その他	11 (%)	56 (0.1)	195 (0.7)	578 (2.6)	2,042 (7.7)	3,376 (27.1)	1,181 (44.9)	78 (15.7)	6 (1.0)	7,523 (0.1)	915	8,438	3.52	0.49
合計	201 (%)	1,119 (0.1)	4,812 (0.4)	18,103 (1.7)	76,668 (6.3)	139,427 (26.8)	43,161 (48.8)	2,116 (15.1)	144 (0.7)	285,751 (0.1)	33,358	319,109	3.55	0.44
記載なし														
総計	201 (%)	1,119 (0.1)	4,812 (0.4)	18,103 (1.7)	76,668 (6.3)	139,427 (26.8)	43,161 (48.8)	2,116 (15.1)	144 (0.7)	285,751 (0.1)	33,358	319,109	3.55	0.44

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D3816##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査