

表 1086 透析前アルブミン濃度(g/dL) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	1.5未満	1.5~	2.0~	2.5~	3.0~	3.5~	4.0~	4.5~	5.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	1 (20.0)	2 (0.4)	2 (0.4)	1 (20.0)	35 (2.1)	177 (7.4)	203 (37.7)	37 (43.2)	2 (7.9)	5 (100.0)	26 (100.0)	5 (100.0)	3.28	1.40
15歳~ (%)	2 (0.4)	2 (0.4)	2 (0.4)	10 (2.1)	35 (7.4)	177 (37.7)	203 (43.2)	37 (7.9)	2 (0.4)	470 (100.0)	26 (100.0)	496 (100.0)	3.91	0.48
30歳~ (%)	1 (0.0)	15 (0.2)	40 (0.5)	149 (2.0)	885 (11.8)	3,513 (47.0)	2,610 (34.9)	259 (3.5)	8 (0.1)	7,480 (100.0)	334 (100.0)	7,814 (100.0)	3.82	0.40
45歳~ (%)	9 (0.0)	71 (0.2)	251 (0.8)	909 (2.7)	5,087 (15.4)	17,323 (52.4)	8,833 (26.7)	555 (1.7)	28 (0.1)	33,066 (100.0)	1,426 (100.0)	34,492 (100.0)	3.73	0.40
60歳~ (%)	63 (0.1)	280 (0.3)	1,255 (1.4)	4,489 (5.1)	22,161 (25.0)	46,092 (52.0)	13,776 (15.5)	501 (0.6)	43 (0.0)	88,660 (100.0)	3,722 (100.0)	92,382 (100.0)	3.58	0.42
75歳~ (%)	62 (0.1)	426 (0.6)	1,875 (2.8)	7,072 (10.5)	24,517 (36.5)	28,437 (42.3)	4,704 (7.0)	133 (0.2)	26 (0.0)	67,252 (100.0)	2,772 (100.0)	70,024 (100.0)	3.39	0.44
90歳~ (%)	3 (0.1)	36 (0.9)	187 (4.5)	773 (18.6)	1,841 (44.3)	1,187 (28.5)	131 (3.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	4,160 (100.0)	161 (100.0)	4,321 (100.0)	3.22	0.45
合計 (%)	141 (0.1)	830 (0.4)	3,610 (1.8)	13,403 (6.7)	54,526 (27.1)	96,730 (48.1)	30,259 (15.0)	1,486 (0.7)	108 (0.1)	201,093 (100.0)	8,441 (100.0)	209,534 (100.0)	3.54	0.45
不明 (%)														
記載なし (%)											2	2		
総計 (%)	141 (0.1)	830 (0.4)	3,610 (1.8)	13,403 (6.7)	54,526 (27.1)	96,730 (48.1)	30,259 (15.0)	1,486 (0.7)	108 (0.1)	201,093 (100.0)	8,443 (100.0)	209,536 (100.0)	3.54	0.45
平均	72.23	74.17	75.06	75.29	72.87	67.90	62.11	56.23	63.64	68.94	68.67	68.93		
標準偏差	12.60	11.34	10.69	10.76	10.92	11.72	12.49	13.60	14.66	12.25	12.38	12.26		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D3821##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査