

表 1090 透析前アルブミン濃度(g/dL) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	16	57	298	1,637	10,306	22,903	7,338	367	16	42,938	1,207	44,145	3.62	0.39
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.7)	(3.8)	(24.0)	(53.3)	(17.1)	(0.9)	(0.0)	(100.0)				
女性	4	37	222	1,096	6,412	12,555	3,093	99	9	23,527	702	24,229	3.57	0.38
(%)	(0.0)	(0.2)	(0.9)	(4.7)	(27.3)	(53.4)	(13.1)	(0.4)	(0.0)	(100.0)				
合計	20	94	520	2,733	16,718	35,458	10,431	466	25	66,465	1,909	68,374	3.60	0.39
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.8)	(4.1)	(25.2)	(53.3)	(15.7)	(0.7)	(0.0)	(100.0)				
記載なし														
(%)														
総計	20	94	520	2,733	16,718	35,458	10,431	466	25	66,465	1,909	68,374	3.60	0.39
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.8)	(4.1)	(25.2)	(53.3)	(15.7)	(0.7)	(0.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。