

表 1093 透析前アルブミン濃度(g/dL) 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	1.5未満	1.5~	2.0~	2.5~	3.0~	3.5~	4.0~	4.5~	5.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性系球体腎炎 (%)	3 (0.0)	23 (0.1)	116 (0.5)	770 (3.5)	5,326 (24.5)	11,793 (54.2)	3,558 (16.4)	163 (0.7)	6 (0.0)	21,758 (100.0)	630	22,388	3.62	0.37
慢性腎盂腎炎 (%)		4 (0.7)	29 (4.8)	151 (25.1)	309 (51.3)	102 (16.9)	7 (1.2)			602 (100.0)	25	627	3.61	0.39
急速進行性系球体腎炎 (%)	1 (0.2)	7 (1.5)	28 (5.9)	145 (30.4)	236 (49.5)	55 (11.5)	4 (0.8)	1 (0.2)		477 (100.0)	7	484	3.53	0.42
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1 (0.2)		14 (3.1)	135 (30.3)	237 (53.1)	57 (12.8)	2 (0.4)			446 (100.0)	13	459	3.58	0.34
その他の分類不能の腎炎 (%)		3 (0.9)	11 (3.2)	61 (17.7)	187 (54.2)	77 (22.3)	6 (1.7)			345 (100.0)	10	355	3.69	0.38
多発性囊胞腎 (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	25 (1.0)	101 (4.0)	697 (27.9)	1,344 (53.7)	319 (12.7)	12 (0.5)	1 (0.0)	2,502 (100.0)	67	2,569	3.57	0.38
腎硬化症 (%)	2 (0.0)	7 (0.1)	60 (1.0)	269 (4.7)	1,612 (28.1)	2,977 (51.8)	777 (13.5)	36 (0.6)	2 (0.0)	5,742 (100.0)	154	5,896	3.57	0.39
悪性高血圧 (%)		2 (0.4)	12 (2.2)	104 (19.4)	292 (54.6)	118 (22.1)	6 (1.1)	1 (0.2)		535 (100.0)	20	555	3.71	0.37
糖尿病性腎症 (%)	11 (0.0)	31 (0.1)	203 (0.9)	987 (4.1)	5,914 (24.8)	12,779 (53.6)	3,754 (15.8)	141 (0.6)	12 (0.1)	23,832 (100.0)	684	24,516	3.61	0.39
SLE腎炎 (%)	1 (0.2)	4 (0.8)	33 (6.4)	164 (31.6)	257 (49.5)	58 (11.2)	2 (0.4)			519 (100.0)	18	537	3.52	0.39
アミロイド腎 (%)	1 (1.1)	2 (2.1)	9 (9.5)	26 (27.4)	41 (43.2)	16 (16.8)				95 (100.0)	3	98	3.49	0.47
痛風腎 (%)	1 (0.5)		13 (5.9)	53 (23.9)	119 (53.6)	33 (14.9)	3 (1.4)			222 (100.0)	5	227	3.60	0.40
先天性代謝異常による腎不全 (%)		1 (1.4)	1 (1.4)	10 (14.3)	36 (51.4)	20 (28.6)	2 (2.9)			70 (100.0)	3	73	3.77	0.41
腎・尿路結核 (%)			5 (11.6)	12 (27.9)	23 (53.5)	3 (7.0)				43 (100.0)	1	44	3.48	0.37
腎・尿路結石 (%)		1 (0.9)	5 (4.7)	21 (19.6)	65 (60.7)	15 (14.0)				107 (100.0)	6	113	3.58	0.35
腎・尿路腫瘍 (%)	1 (0.5)		7 (3.8)	46 (24.7)	111 (59.7)	21 (11.3)				186 (100.0)	4	190	3.58	0.36
閉塞性尿路障害 (%)		3 (2.0)	3 (2.0)	34 (22.7)	75 (50.0)	35 (23.3)				150 (100.0)	1	151	3.64	0.39
骨髄腫 (%)		1 (2.8)	2 (5.6)	13 (36.1)	16 (44.4)	4 (11.1)				36 (100.0)	1	37	3.48	0.43
腎形成不全 (%)			1 (0.6)	25 (15.0)	79 (47.3)	58 (34.7)	4 (2.4)			167 (100.0)	4	171	3.80	0.37
不明 (%)	2 (0.0)	17 (0.3)	55 (0.9)	318 (5.0)	1,617 (25.6)	3,287 (52.0)	961 (15.2)	61 (1.0)	1 (0.0)	6,319 (100.0)	212	6,531	3.59	0.40
再導入 (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	4 (0.6)	15 (2.4)	133 (21.5)	350 (56.6)	112 (18.1)	1 (0.2)	1 (0.2)	618 (100.0)	15	633	3.65	0.39
その他 (%)		7 (0.4)	29 (1.7)	100 (5.9)	419 (24.7)	845 (49.9)	278 (16.4)	16 (0.9)		1,694 (100.0)	26	1,720	3.58	0.43
合計 (%)	20 (0.0)	94 (0.1)	520 (0.8)	2,733 (4.1)	16,718 (25.2)	35,458 (53.3)	10,431 (15.7)	466 (0.7)	25 (0.0)	66,465 (100.0)	1,909	68,374	3.60	0.39
記載なし (%)														
総計 (%)	20 (0.0)	94 (0.1)	520 (0.8)	2,733 (4.1)	16,718 (25.2)	35,458 (53.3)	10,431 (15.7)	466 (0.7)	25 (0.0)	66,465 (100.0)	1,909	68,374	3.60	0.39

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D3833##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査