

表 1100 透析前CRP濃度(mg/dL) 治療方法別(透析患者全体)

治療方法	0.2未満	0.2~	0.5~	1.0~	2.0~	4.0~	6.0~	8.0~	10.0~	15.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析	97,901 (%)	36,044 (20.2)	18,660 (10.5)	12,363 (6.9)	7,338 (4.1)	2,690 (1.5)	1,389 (0.8)	704 (0.4)	815 (0.5)	518 (0.3)	178,422 (100.0)	55,282	233,704	0.67	1.90
血液透析濾過	34,560 (%)	12,004 (57.4)	6,115 (19.9)	3,862 (10.2)	2,170 (6.4)	719 (3.6)	310 (1.2)	166 (0.5)	165 (0.3)	104 (0.3)	60,175 (100.0)	14,624	74,799	0.55	1.51
血液濾過	1 (%)	5 (8.3)	1 (41.7)	1 (8.3)	2 (8.3)	1 (16.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	12 (100.0)	7	19	3.87	8.40
血液吸着透析	574 (%)	253 (51.1)	136 (22.5)	80 (12.1)	51 (7.1)	15 (4.5)	6 (1.3)	1 (0.5)	4 (0.1)	4 (0.4)	4,124 (100.0)	231	1,355	0.63	1.55
在宅血液透析	268 (%)	79 (63.7)	40 (18.8)	14 (9.5)	9 (3.3)	4 (2.1)	1 (1.0)	1 (0.2)	4 (0.4)	2 (0.4)	421 (100.0)	196	617	0.55	1.84
腹膜透析	2,918 (%)	975 (56.7)	525 (18.9)	379 (10.2)	197 (7.4)	66 (3.8)	34 (1.3)	19 (0.7)	23 (0.4)	10 (0.4)	5,146 (100.0)	3,469	8,615	0.62	1.58
合計	136,222 (%)	49,360 (20.1)	25,477 (10.4)	16,699 (6.8)	9,767 (4.0)	3,494 (1.4)	1,741 (0.7)	890 (0.4)	1,011 (0.4)	639 (0.3)	245,300 (100.0)	73,809	319,109	0.64	1.80
記載なし															
総計	136,222 (%)	49,360 (20.1)	25,477 (10.4)	16,699 (6.8)	9,767 (4.0)	3,494 (1.4)	1,741 (0.7)	890 (0.4)	1,011 (0.4)	639 (0.3)	245,300 (100.0)	73,809	319,109	0.64	1.80

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D3910##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査