

表 1103 透析前CRP濃度(mg/dL) 性別 (透析患者全体)

性別	0.2未満	0.2~	0.5~	1.0~	2.0~	4.0~	6.0~	8.0~	10.0~	15.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	83,821 (52.9)	33,767 (21.3)	17,452 (11.0)	11,349 (7.2)	6,660 (4.2)	2,365 (1.5)	1,172 (0.7)	617 (0.4)	697 (0.4)	425 (0.3)	158,325 (100.0)	47,598	205,923	0.67	1.83
女性 (%)	52,401 (60.2)	15,593 (17.9)	8,025 (9.2)	5,350 (6.2)	3,107 (3.6)	1,129 (1.3)	569 (0.7)	273 (0.3)	314 (0.4)	214 (0.2)	86,975 (100.0)	26,210	113,185	0.58	1.76
合計 (%)	136,222 (55.5)	49,360 (20.1)	25,477 (10.4)	16,699 (6.8)	9,767 (4.0)	3,494 (1.4)	1,741 (0.7)	890 (0.4)	1,011 (0.4)	639 (0.3)	245,300 (100.0)	73,808	319,108	0.64	1.80
記載なし (%)												1	1		
総計 (%)	136,222 (55.5)	49,360 (20.1)	25,477 (10.4)	16,699 (6.8)	9,767 (4.0)	3,494 (1.4)	1,741 (0.7)	890 (0.4)	1,011 (0.4)	639 (0.3)	245,300 (100.0)	73,809	319,109	0.64	1.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3913##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査