

表 1106 透析前CRP濃度(mg/dL) 原疾患別(透析患者全体)

| 原疾患 | 0.2未満 | 0.2~ | 0.5~ | 1.0~ | 2.0~ | 4.0~ | 6.0~ | 8.0~ | 10.0~ | 15.0~ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------|---------|------|------|
| 慢性糸球体腎炎 | 41,194 (58.8) | 13,665 (19.5) | 6,708 (9.6) | 4,247 (6.1) | 2,417 (3.5) | 832 (1.2) | 408 (0.6) | 211 (0.3) | 215 (0.3) | 145 (0.2) | 70,042 (100.0) | 21,741 | 91,783 | 0.56 | 1.65 |
| 慢性腎盂腎炎 | 1,276 (56.6) | 434 (19.2) | 243 (10.8) | 140 (6.2) | 80 (3.5) | 36 (1.6) | 23 (1.0) | 5 (0.2) | 14 (0.6) | 5 (0.2) | 2,256 (100.0) | 640 | 2,896 | 0.66 | 1.83 |
| 急速進行性糸球体腎炎 | 1,078 (54.0) | 388 (19.4) | 218 (10.9) | 136 (6.8) | 101 (5.1) | 42 (2.1) | 15 (0.8) | 8 (0.4) | 6 (0.3) | 6 (0.3) | 1,998 (100.0) | 540 | 2,538 | 0.70 | 1.85 |
| 妊娠腎/妊娠中毒症 | 705 (61.5) | 221 (19.3) | 81 (7.1) | 74 (6.5) | 39 (3.4) | 11 (1.0) | 4 (0.3) | 3 (0.3) | 4 (0.3) | 4 (0.3) | 1,146 (100.0) | 337 | 1,483 | 0.55 | 1.80 |
| その他の分類不能の腎炎 | 683 (60.7) | 207 (18.4) | 113 (10.0) | 68 (6.0) | 35 (3.1) | 4 (0.4) | 2 (0.2) | 6 (0.5) | 3 (0.3) | 5 (0.4) | 1,126 (100.0) | 328 | 1,454 | 0.53 | 1.69 |
| 多発性囊胞腎 | 4,821 (53.7) | 1,868 (20.8) | 974 (10.9) | 605 (6.7) | 387 (4.3) | 133 (1.5) | 73 (0.8) | 32 (0.4) | 42 (0.5) | 40 (0.4) | 8,975 (100.0) | 2,496 | 11,471 | 0.72 | 2.18 |
| 腎硬化症 | 13,091 (53.4) | 5,030 (20.5) | 2,739 (11.2) | 1,867 (7.6) | 1,006 (4.1) | 371 (1.5) | 175 (0.7) | 82 (0.3) | 97 (0.4) | 61 (0.2) | 24,519 (100.0) | 7,131 | 31,650 | 0.66 | 1.86 |
| 悪性高血圧 | 1,241 (59.7) | 367 (17.7) | 215 (10.4) | 127 (6.1) | 75 (3.6) | 22 (1.1) | 8 (0.4) | 9 (0.4) | 9 (0.4) | 4 (0.2) | 2,077 (100.0) | 644 | 2,721 | 0.56 | 1.58 |
| 糖尿病性腎症 | 51,823 (54.3) | 19,515 (20.5) | 10,169 (10.7) | 6,733 (7.1) | 3,970 (4.2) | 1,417 (1.5) | 735 (0.8) | 365 (0.4) | 435 (0.5) | 235 (0.2) | 95,397 (100.0) | 28,260 | 123,657 | 0.66 | 1.78 |
| SLE腎炎 | 904 (52.5) | 369 (21.4) | 183 (10.6) | 120 (7.0) | 80 (4.6) | 33 (1.9) | 10 (0.6) | 8 (0.5) | 3 (0.2) | 11 (0.6) | 1,721 (100.0) | 501 | 2,222 | 0.74 | 2.12 |
| アミロイド腎 | 174 (49.4) | 78 (22.2) | 34 (9.7) | 28 (8.0) | 21 (6.0) | 6 (1.7) | 4 (1.1) | 3 (0.9) | 4 (1.1) | 4 (1.1) | 352 (100.0) | 86 | 438 | 0.82 | 1.80 |
| 痛風腎 | 428 (52.2) | 191 (23.3) | 75 (9.1) | 62 (7.6) | 42 (5.1) | 10 (1.2) | 6 (0.7) | 2 (0.2) | 1 (0.1) | 3 (0.4) | 820 (100.0) | 236 | 1,056 | 0.66 | 2.16 |
| 先天性代謝異常による腎不全 | 132 (61.7) | 32 (15.0) | 17 (7.9) | 16 (7.5) | 6 (2.8) | 5 (2.3) | 2 (0.9) | 1 (0.5) | 3 (1.4) | 214 (100.0) | 67 | 281 | 0.95 | 3.61 | |
| 腎・尿路結核 | 68 (55.7) | 21 (17.2) | 14 (11.5) | 6 (4.9) | 8 (6.6) | 2 (1.6) | 2 (1.6) | 1 (0.8) | 1 (0.8) | 122 (100.0) | 46 | 168 | 0.70 | 1.51 | |
| 腎・尿路結石 | 231 (53.0) | 86 (19.7) | 53 (12.2) | 29 (6.7) | 24 (5.5) | 8 (1.8) | 2 (0.5) | 2 (0.5) | 1 (0.2) | 436 (100.0) | 142 | 578 | 0.62 | 1.26 | |
| 腎・尿路腫瘍 | 379 (50.9) | 173 (23.3) | 69 (9.3) | 47 (6.3) | 37 (5.0) | 16 (2.2) | 7 (0.9) | 3 (0.4) | 6 (0.8) | 7 (0.9) | 744 (100.0) | 215 | 959 | 0.89 | 2.41 |
| 閉塞性尿路障害 | 310 (53.3) | 119 (20.4) | 72 (12.4) | 41 (7.0) | 17 (2.9) | 12 (2.1) | 6 (1.0) | 2 (0.3) | 1 (0.2) | 2 (0.3) | 582 (100.0) | 161 | 743 | 0.64 | 1.60 |
| 骨髄腫 | 123 (48.0) | 47 (18.4) | 33 (12.9) | 22 (8.6) | 13 (5.1) | 8 (3.1) | 5 (2.0) | 1 (0.4) | 2 (0.8) | 2 (0.8) | 256 (100.0) | 67 | 323 | 1.05 | 2.72 |
| 腎形成不全 | 329 (63.9) | 99 (19.2) | 45 (8.7) | 20 (3.9) | 13 (2.5) | 5 (1.0) | 3 (0.6) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 515 (100.0) | 149 | 664 | 0.38 | 0.89 | |
| 不明 | 12,876 (54.0) | 4,819 (20.2) | 2,548 (10.7) | 1,686 (7.1) | 1,054 (4.4) | 385 (1.6) | 186 (0.8) | 101 (0.4) | 120 (0.5) | 71 (0.3) | 23,846 (100.0) | 7,566 | 31,412 | 0.69 | 1.98 |
| 再導入 | 943 (56.3) | 334 (19.9) | 171 (10.2) | 122 (7.3) | 59 (3.5) | 18 (1.1) | 9 (0.5) | 4 (0.2) | 9 (0.5) | 7 (0.4) | 1,676 (100.0) | 498 | 2,174 | 0.62 | 1.74 |
| その他 | 3,413 (52.7) | 1,297 (20.0) | 703 (10.8) | 503 (7.8) | 283 (4.4) | 118 (1.8) | 56 (0.9) | 41 (0.6) | 38 (0.6) | 28 (0.4) | 6,480 (100.0) | 1,958 | 8,438 | 0.78 | 2.08 |
| 合計 | 136,222 (55.5) | 49,360 (20.1) | 25,477 (10.4) | 16,699 (6.8) | 9,767 (4.0) | 3,494 (1.4) | 1,741 (0.7) | 890 (0.4) | 1,011 (0.4) | 639 (0.3) | 245,300 (100.0) | 73,809 | 319,109 | 0.64 | 1.80 |
| 記載なし | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 | 136,222 (55.5) | 49,360 (20.1) | 25,477 (10.4) | 16,699 (6.8) | 9,767 (4.0) | 3,494 (1.4) | 1,741 (0.7) | 890 (0.4) | 1,011 (0.4) | 639 (0.3) | 245,300 (100.0) | 73,809 | 319,109 | 0.64 | 1.80 |

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D3916##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査