

表 1108 透析前CRP濃度(mg/dL) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

| 性別 | 0.2未満 | 0.2～ | 0.5～ | 1.0～ | 2.0～ | 4.0～ | 6.0～ | 8.0～ | 10.0～ | 15.0～ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|------|------|
| 男性 | 57,901 | 23,740 | 12,277 | 8,047 | 4,786 | 1,708 | 878 | 450 | 529 | 322 | 110,638 | 24,812 | 135,450 | 0.69 | 1.90 |
| (%) | (52.3) | (21.5) | (11.1) | (7.3) | (4.3) | (1.5) | (0.8) | (0.4) | (0.5) | (0.3) | (100.0) | | | | |
| 女性 | 36,238 | 10,883 | 5,612 | 3,787 | 2,205 | 836 | 431 | 214 | 237 | 156 | 60,599 | 13,486 | 74,085 | 0.60 | 1.85 |
| (%) | (59.8) | (18.0) | (9.3) | (6.2) | (3.6) | (1.4) | (0.7) | (0.4) | (0.4) | (0.3) | (100.0) | | | | |
| 合計 | 94,139 | 34,623 | 17,889 | 11,834 | 6,991 | 2,544 | 1,309 | 664 | 766 | 478 | 171,237 | 38,298 | 209,535 | 0.66 | 1.88 |
| (%) | (55.0) | (20.2) | (10.4) | (6.9) | (4.1) | (1.5) | (0.8) | (0.4) | (0.4) | (0.3) | (100.0) | | | | |
| 記載なし | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 | 94,139 | 34,623 | 17,889 | 11,834 | 6,991 | 2,544 | 1,309 | 664 | 766 | 478 | 171,237 | 38,299 | 209,536 | 0.66 | 1.88 |
| (%) | (55.0) | (20.2) | (10.4) | (6.9) | (4.1) | (1.5) | (0.8) | (0.4) | (0.4) | (0.3) | (100.0) | | | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3920##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査