

表 1113 透析前CRP濃度(mg/dL) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	0.2未満	0.2~	0.5~	1.0~	2.0~	4.0~	6.0~	8.0~	10.0~	15.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	20,858 (55.1)	7,922 (20.9)	4,077 (10.8)	2,559 (6.8)	1,429 (3.8)	492 (1.3)	200 (0.5)	126 (0.3)	113 (0.3)	58 (0.2)	37,834 (100.0)	6,311	44,145	0.58	1.53
女性 (%)	12,850 (62.1)	3,729 (18.0)	1,848 (8.9)	1,190 (5.7)	675 (3.3)	201 (1.0)	93 (0.4)	36 (0.2)	47 (0.2)	40 (0.2)	20,709 (100.0)	3,520	24,229	0.49	1.44
合計 (%)	33,708 (57.6)	11,651 (19.9)	5,925 (10.1)	3,749 (6.4)	2,104 (3.6)	693 (1.2)	293 (0.5)	162 (0.3)	160 (0.3)	98 (0.2)	58,543 (100.0)	9,831	68,374	0.55	1.50
記載なし (%)															
総計 (%)	33,708 (57.6)	11,651 (19.9)	5,925 (10.1)	3,749 (6.4)	2,104 (3.6)	693 (1.2)	293 (0.5)	162 (0.3)	160 (0.3)	98 (0.2)	58,543 (100.0)	9,831	68,374	0.55	1.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3930##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査