

表 1118 CRP濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	1,819 (54.1)	688 (20.5)	352 (10.5)	265 (7.9)	141 (4.2)	43 (1.3)	21 (0.6)	13 (0.4)	17 (0.5)	5 (0.1)	3,364 (100.0)	2,238	5,602	0.64	1.53
女性 (%)	1,099 (61.7)	287 (16.1)	173 (9.7)	114 (6.4)	56 (3.1)	23 (1.3)	13 (0.7)	6 (0.3)	6 (0.3)	5 (0.3)	1,782 (100.0)	1,231	3,013	0.58	1.66
合計 (%)	2,918 (56.7)	975 (18.9)	525 (10.2)	379 (7.4)	197 (3.8)	66 (1.3)	34 (0.7)	19 (0.4)	23 (0.4)	10 (0.2)	5,146 (100.0)	3,469	8,615	0.62	1.58
記載なし (%)															
総計 (%)	2,918 (56.7)	975 (18.9)	525 (10.2)	379 (7.4)	197 (3.8)	66 (1.3)	34 (0.7)	19 (0.4)	23 (0.4)	10 (0.2)	5,146 (100.0)	3,469	8,615	0.62	1.58

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3940##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査