

表 1125 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 併用の状況別(透析患者全体)

併用の状況	7.0未満	7.0~	7.5~	8.0~	8.4~	8.5~	9.0~	9.5~	10.0~	10.1~	10.5~	11.0~	11.5~	12.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独	1,257 (%)	1,794 (0.6)	7,008 (2.5)	19,328 (6.9)	8,568 (3.1)	70,274 (25.2)	83,204 (29.9)	52,533 (18.9)	6,597 (2.4)	15,932 (5.7)	7,836 (2.8)	2,571 (0.9)	924 (0.3)	608 (0.2)	278,434 (100.0)	31,704	310,138	9.16	0.74
PD単独	29 (%)	34 (0.6)	96 (0.8)	194 (2.1)	85 (4.3)	750 (1.9)	1,284 (16.7)	1,129 (28.6)	146 (25.2)	414 (3.3)	198 (9.2)	84 (4.4)	27 (1.9)	12 (0.6)	4,482 (0.3)	2,449	6,931	9.36	0.80
HD(F)単独:PDカテあり	1 (%)	6 (0.7)	2 (4.0)	6 (1.3)	37 (4.0)	42 (24.7)	31 (28.0)	6 (20.7)	9 (4.0)	9 (6.0)	9 (6.0)	1 (0.7)	150 (0.7)	27 (100.0)	177	9.24	0.81		
PD:HD併用週1HD(F)	7 (%)	4 (0.6)	23 (0.3)	52 (2.0)	24 (4.5)	211 (2.1)	338 (18.2)	289 (29.1)	42 (24.9)	106 (3.6)	46 (9.1)	12 (4.0)	4 (1.0)	2 (0.3)	1,160 (0.2)	336	1,496	9.34	0.74
PD:HD併用週2HD(F)			3 (2.2)	5 (3.7)	3 (2.2)	20 (14.7)	42 (30.9)	37 (27.2)	4 (2.9)	16 (11.8)	5 (3.7)	1 (0.7)		136 (100.0)	29	165	9.40	0.66	
PD:HD併用週3HD(F)		1 (3.2)	2 (6.5)	3 (9.7)	2 (6.5)	6 (19.4)	8 (25.8)	3 (9.7)		2 (6.5)	1 (3.2)	1 (3.2)	1 (3.2)	1 (100.0)	6 (100.0)	37	9.25	1.27	
PD:HD併用週4HD(F)					1 (100.0)									1 (100.0)		1 (100.0)	8.90		
PD:HD併用その他			1 (2.1)	1 (2.1)	1 (2.1)	8 (16.7)	18 (37.5)	13 (27.1)	4 (8.3)	2 (4.2)					48 (100.0)	15 (100.0)	63	9.29	0.54
合計	1,294 (%)	1,833 (0.5)	7,139 (2.5)	19,585 (6.9)	8,689 (3.1)	71,307 (25.1)	84,936 (29.9)	54,035 (19.0)	6,799 (2.4)	16,481 (5.8)	8,095 (2.8)	2,669 (0.9)	957 (0.3)	623 (0.2)	284,442 (100.0)	34,566	319,008	9.16	0.75
不明				3 (20.0)	1 (6.7)	6 (40.0)	2 (13.3)	2 (13.3)			1 (6.7)				15 (100.0)	7 (100.0)	22	8.87	0.64
記載なし															79 (100.0)	79	79		
総計	1,294 (%)	1,833 (0.5)	7,139 (2.5)	19,588 (6.9)	8,690 (3.1)	71,313 (25.1)	84,938 (29.9)	54,037 (19.0)	6,799 (2.4)	16,481 (5.8)	8,096 (2.8)	2,669 (0.9)	957 (0.3)	623 (0.2)	284,457 (100.0)	34,652	319,109	9.16	0.75

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D4012##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査