

表 1126 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 性別(透析患者全体)

性別	7.0未満	7.0~	7.5~	8.0~	8.4~	8.5~	9.0~	9.5~	10.0~	10.1~	10.5~	11.0~	11.5~	12.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	820 (%)	1,266 (0.7)	4,980 (2.7)	14,031 (7.6)	6,150 (3.4)	48,825 (26.6)	54,358 (29.6)	32,689 (17.8)	3,989 (2.2)	9,613 (5.2)	4,549 (2.5)	1,444 (0.8)	501 (0.3)	336 (0.2)	183,551 (100.0)	22,372 (100.0)	205,923 (100.0)	9.12 (100.0)	0.73 (100.0)
女性	474 (%)	567 (0.6)	2,159 (2.1)	5,557 (5.5)	2,540 (2.5)	22,488 (22.3)	30,580 (30.3)	21,348 (21.2)	2,810 (2.8)	6,868 (6.8)	3,547 (3.5)	1,225 (1.2)	456 (0.5)	287 (0.3)	100,906 (100.0)	12,279 (100.0)	113,185 (100.0)	9.25 (100.0)	0.76 (100.0)
合計	1,294 (%)	1,833 (0.6)	7,139 (2.5)	19,588 (6.9)	8,690 (3.1)	71,313 (25.1)	84,938 (29.9)	54,037 (19.0)	6,799 (2.4)	16,481 (5.8)	8,096 (2.8)	2,669 (0.9)	957 (0.3)	623 (0.2)	284,457 (100.0)	34,651 (100.0)	319,108 (100.0)	9.16 (100.0)	0.75 (100.0)
記載なし (%)															1	1			
総計	1,294 (%)	1,833 (0.6)	7,139 (2.5)	19,588 (6.9)	8,690 (3.1)	71,313 (25.1)	84,938 (29.9)	54,037 (19.0)	6,799 (2.4)	16,481 (5.8)	8,096 (2.8)	2,669 (0.9)	957 (0.3)	623 (0.2)	284,457 (100.0)	34,652 (100.0)	319,109 (100.0)	9.16 (100.0)	0.75 (100.0)

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D4013#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査