

表 1129 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 原疾患別 (透析患者全体)

原疾患	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎	353 (%)	506 (0.6)	2,003 (2.4)	5,149 (6.3)	2,139 (2.6)	18,683 (22.8)	24,027 (29.3)	17,062 (20.8)	2,287 (2.8)	5,599 (6.8)	2,748 (3.4)	906 (1.1)	316 (0.4)	211 (0.3)	81,989 (100.0)	9,794	91,783	9.22	0.76
慢性腎盂腎炎	11 (%)	21 (0.8)	67 (2.6)	144 (5.5)	76 (2.9)	544 (20.8)	766 (29.3)	573 (21.9)	81 (3.1)	191 (7.3)	108 (4.1)	23 (0.9)	5 (0.2)	4 (0.2)	2,614 (100.0)	282	2,896	9.25	0.77
急速進行性糸球体腎炎	13 (%)	13 (0.6)	52 (2.3)	147 (6.6)	67 (3.0)	536 (23.9)	746 (33.2)	409 (18.2)	58 (2.6)	116 (5.2)	54 (2.4)	23 (1.0)	6 (0.3)	4 (0.2)	2,244 (100.0)	294	2,538	9.16	0.72
妊娠腎/妊娠中毒症	10 (%)	7 (0.5)	35 (2.6)	90 (6.7)	33 (2.4)	254 (18.8)	393 (29.0)	305 (22.5)	40 (3.0)	118 (8.7)	47 (3.5)	11 (0.8)	6 (0.4)	4 (0.3)	1,353 (100.0)	130	1,483	9.26	0.78
その他の分類不能の腎炎	9 (%)	20 (0.7)	29 (1.5)	70 (2.2)	44 (5.3)	317 (24.1)	391 (29.7)	262 (19.9)	34 (2.6)	85 (6.5)	42 (3.2)	10 (0.8)	2 (0.2)	2 (0.2)	1,317 (100.0)	137	1,454	9.17	0.76
多発性嚢胞腎	49 (%)	47 (0.5)	206 (2.0)	589 (5.7)	255 (2.5)	2,387 (23.0)	3,165 (30.5)	2,195 (21.2)	261 (2.5)	695 (6.7)	362 (3.5)	90 (0.9)	44 (0.4)	18 (0.2)	10,363 (100.0)	1,108	11,471	9.23	0.74
腎硬化症	109 (%)	174 (0.6)	662 (2.3)	1,911 (6.8)	918 (3.2)	7,274 (25.7)	8,721 (30.9)	5,292 (18.7)	617 (2.2)	1,479 (5.2)	741 (2.6)	232 (0.8)	80 (0.3)	59 (0.2)	28,269 (100.0)	3,381	31,650	9.15	0.72
悪性高血圧	15 (%)	8 (0.3)	75 (3.1)	160 (6.7)	75 (3.1)	602 (25.2)	687 (28.8)	476 (20.0)	70 (2.9)	121 (5.1)	71 (3.0)	15 (0.6)	7 (0.3)	3 (0.1)	2,385 (100.0)	336	2,721	9.15	0.75
糖尿病性腎症	526 (%)	774 (0.5)	2,955 (2.7)	8,442 (7.6)	3,827 (3.5)	29,955 (27.1)	33,067 (29.9)	19,034 (17.2)	2,301 (2.1)	5,466 (5.0)	2,615 (2.4)	918 (0.8)	332 (0.3)	206 (0.2)	110,418 (100.0)	13,239	123,657	9.10	0.73
SLE腎炎	7 (%)	7 (0.4)	46 (2.3)	119 (6.0)	46 (2.3)	438 (22.2)	594 (30.2)	414 (21.0)	51 (2.6)	145 (7.4)	73 (3.7)	23 (1.2)	4 (0.2)	3 (0.2)	1,970 (100.0)	252	2,222	9.24	0.73
アミロイド腎	2 (%)	2 (0.5)	5 (1.3)	21 (5.4)	12 (3.1)	102 (26.4)	111 (28.7)	86 (22.2)	7 (1.8)	25 (6.5)	9 (2.3)	3 (0.8)	1 (0.3)	1 (0.3)	387 (100.0)	51	438	9.21	0.68
痛風腎	5 (%)	9 (0.5)	22 (1.0)	80 (8.5)	19 (2.0)	227 (24.0)	277 (29.3)	180 (19.0)	24 (2.5)	64 (6.8)	24 (2.5)	7 (0.7)	5 (0.5)	3 (0.3)	946 (100.0)	110	1,056	9.17	0.78
先天性代謝異常による腎不全	3 (%)	5 (1.2)	8 (2.0)	23 (3.1)	6 (2.4)	55 (21.7)	77 (30.3)	43 (16.9)	6 (2.4)	15 (5.9)	9 (3.5)	2 (0.8)	2 (0.8)		254 (100.0)	27	281	9.12	0.81
腎・尿路結核		2 (%)	2 (1.3)	11 (1.3)	1 (0.7)	35 (23.5)	45 (30.2)	26 (17.4)	6 (4.0)	13 (8.7)	6 (4.0)		2 (1.3)		149 (100.0)	19	168	9.25	0.76
腎・尿路結石	1 (%)	3 (0.2)	15 (0.6)	27 (2.9)	12 (5.3)	138 (26.9)	153 (29.8)	85 (16.6)	13 (2.5)	32 (6.2)	26 (5.1)	5 (1.0)	2 (0.4)	1 (0.2)	513 (100.0)	65	578	9.21	0.76
腎・尿路腫瘍	1 (%)	8 (0.1)	20 (0.9)	66 (2.3)	23 (7.7)	244 (28.5)	242 (28.2)	154 (18.0)	16 (1.9)	50 (5.8)	21 (2.5)	7 (0.8)	2 (0.2)	3 (0.4)	857 (100.0)	102	959	9.13	0.72
閉塞性尿路障害	6 (%)	7 (0.9)	22 (1.1)	33 (3.3)	22 (5.0)	165 (25.1)	192 (29.2)	120 (18.3)	21 (3.2)	39 (5.9)	20 (3.0)	7 (1.1)	1 (0.2)	2 (0.3)	657 (100.0)	86	743	9.16	0.78
骨髄腫	4 (%)	4 (1.4)	12 (4.2)	22 (7.7)	6 (2.1)	85 (29.8)	77 (27.0)	38 (13.3)	6 (2.1)	21 (7.4)	7 (2.5)	2 (0.7)	1 (0.4)		285 (100.0)	38	323	9.06	0.79
腎形成不全	4 (%)	2 (0.7)	20 (0.3)	37 (3.4)	19 (3.2)	141 (23.8)	166 (28.0)	109 (18.4)	19 (3.2)	39 (6.6)	17 (2.9)	14 (2.4)	3 (0.5)	2 (0.3)	592 (100.0)	72	664	9.22	0.84
不明	102 (%)	149 (0.4)	639 (2.3)	1,836 (6.7)	813 (3.0)	6,847 (24.9)	8,288 (30.1)	5,340 (19.4)	631 (2.3)	1,607 (5.8)	805 (2.9)	273 (1.0)	105 (0.4)	73 (0.3)	27,508 (100.0)	3,904	31,412	9.18	0.74
再導入	15 (%)	23 (0.8)	51 (1.2)	136 (7.1)	55 (2.9)	452 (23.6)	515 (26.9)	402 (21.0)	47 (2.5)	129 (6.7)	60 (3.1)	21 (1.1)	5 (0.3)	4 (0.2)	1,915 (100.0)	259	2,174	9.17	0.79
その他	49 (%)	42 (0.7)	193 (2.6)	475 (6.4)	222 (3.0)	1,832 (24.5)	2,238 (30.0)	1,432 (19.2)	203 (2.7)	432 (5.8)	231 (3.1)	77 (1.0)	28 (0.4)	18 (0.2)	7,472 (100.0)	966	8,438	9.17	0.78
合計	1,294 (%)	1,833 (0.6)	7,139 (2.5)	19,588 (6.9)	8,690 (3.1)	71,313 (25.1)	84,938 (29.9)	54,037 (19.0)	6,799 (2.4)	16,481 (5.8)	8,096 (2.8)	2,669 (0.9)	957 (0.3)	623 (0.2)	284,457 (100.0)	34,652	319,109	9.16	0.75
記載なし																			
総計	1,294 (%)	1,833 (0.6)	7,139 (2.5)	19,588 (6.9)	8,690 (3.1)	71,313 (25.1)	84,938 (29.9)	54,037 (19.0)	6,799 (2.4)	16,481 (5.8)	8,096 (2.8)	2,669 (0.9)	957 (0.3)	623 (0.2)	284,457 (100.0)	34,652	319,109	9.16	0.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D4016##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査