

表 1144 補正カルシウム濃度(mg/dL) 性別(腹膜透析患者)

性別	7.0未満	7.0~	7.5~	8.0~	8.4~	8.5~	9.0~	9.5~	10.0~	10.1~	10.5~	11.0~	11.5~	12.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	26 (%)	28 (0.7)	79 (0.7)	187 (2.1)	74 (5.0)	702 (2.0)	1,165 (18.7)	894 (31.0)	108 (23.8)	298 (2.9)	124 (7.9)	51 (3.3)	21 (1.4)	7 (0.6)	3,764 (0.2)	1,838 (100.0)	5,602 1,001	9.29 3,013	0.77 9.49
女性	10 (%)	10 (0.5)	43 (0.5)	62 (2.1)	36 (3.1)	282 (1.8)	499 (14.0)	559 (24.8)	87 (27.8)	237 (4.3)	124 (11.8)	46 (6.2)	10 (2.3)	7 (0.5)	2,012 (0.3)	1,001 (100.0)	3,013 1,001	9.49 0.79	
合計	36 (%)	38 (0.7)	122 (2.1)	249 (4.3)	110 (1.9)	984 (17.0)	1,664 (28.8)	1,453 (25.2)	195 (3.4)	535 (9.3)	248 (4.3)	97 (4.3)	31 (1.7)	14 (0.5)	5,776 (0.2)	2,839 (100.0)	8,615 2,839	9.36 8,615	0.79 9.36
記載なし (%)																			
総計	36 (%)	38 (0.7)	122 (2.1)	249 (4.3)	110 (1.9)	984 (17.0)	1,664 (28.8)	1,453 (25.2)	195 (3.4)	535 (9.3)	248 (4.3)	97 (1.7)	31 (0.5)	14 (0.2)	5,776 (100.0)	2,839 2,839	8,615 8,615	9.36 9.36	0.79 0.79

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D4050#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査