

表 1145 補正カルシウム濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	7.0未満	7.0~	7.5~	8.0~	8.4~	8.5~	9.0~	9.5~	10.0~	10.1~	10.5~	11.0~	11.5~	12.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	
15歳未満 (%)				2		2	8	12	2	11	13	7	1	3	61	24	85	10.20	0.99	
15歳~ (%)	1 (1.6)	1 (1.6)	2 (3.3)	2 (3.3)		(3.3)	(13.1)	(19.7)	(3.3)	(18.0)	(21.3)	(11.5)	(1.6)	(4.9)	(100.0)	61	33	94	9.51	0.98
30歳~ (%)	6 (1.5)	6 (1.5)	12 (3.0)	15 (3.7)	11 (2.7)	87 (21.4)	115 (28.3)	90 (22.2)	10 (2.5)	31 (7.6)	15 (3.7)	6 (1.5)	2 (0.5)		(100.0)	406	202	608	9.22	0.84
45歳~ (%)	9 (0.6)	7 (0.5)	46 (3.0)	84 (5.5)	32 (2.1)	281 (18.4)	435 (28.5)	364 (23.8)	48 (3.1)	130 (8.5)	58 (3.8)	23 (1.5)	7 (0.5)	3 (0.2)	(100.0)	1,527	756	2,283	9.30	0.79
60歳~ (%)	17 (0.7)	16 (0.6)	49 (1.9)	108 (4.3)	51 (2.0)	416 (16.4)	741 (29.2)	635 (25.0)	96 (3.8)	253 (10.0)	96 (3.8)	41 (1.6)	12 (0.5)	4 (0.2)	(100.0)	2,535	1,183	3,718	9.37	0.77
75歳~ (%)	3 (0.3)	8 (0.7)	12 (1.1)	38 (3.4)	16 (1.4)	180 (16.2)	327 (29.4)	315 (28.4)	35 (3.2)	94 (8.5)	53 (4.8)	18 (1.6)	8 (0.7)	4 (0.4)	(100.0)	1,111	590	1,701	9.41	0.75
90歳~ (%)			1 (1.3)			11 (14.7)	24 (32.0)	23 (30.7)	3 (4.0)	7 (9.3)	5 (6.7)	1 (1.3)			(100.0)	75	51	126	9.54	0.59
合計 (%)	36 (0.6)	38 (0.7)	122 (2.1)	249 (4.3)	110 (1.9)	984 (17.0)	1,664 (28.8)	1,453 (25.2)	195 (3.4)	535 (9.3)	248 (4.3)	97 (1.7)	31 (0.5)	14 (0.2)	(100.0)	5,776	2,839	8,615	9.36	0.79
不明 (%)																				
記載なし (%)																				
総計 (%)	36 (0.6)	38 (0.7)	122 (2.1)	249 (4.3)	110 (1.9)	984 (17.0)	1,664 (28.8)	1,453 (25.2)	195 (3.4)	535 (9.3)	248 (4.3)	97 (1.7)	31 (0.5)	14 (0.2)	(100.0)	5,776	2,839	8,615	9.36	0.79
平均	59.17	61.74	59.43	61.89	61.98	62.74	63.65	64.08	64.03	62.27	60.57	59.96	62.03	56.07	63.03	63.42	63.16			
標準偏差	14.56	13.71	13.00	12.75	11.96	13.37	13.61	14.26	13.73	15.60	19.79	19.74	18.17	29.49	14.42	14.61	14.48			

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

#D4051#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査