

表 1147 補正カルシウム濃度(mg/dL) 原疾患別(腹膜透析患者)

原疾患	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	12 (0.7)	10 (0.5)	43 (2.4)	69 (3.8)	32 (1.8)	303 (16.6)	506 (27.7)	483 (26.4)	65 (3.6)	175 (9.6)	86 (4.7)	29 (1.6)	10 (0.5)	4 (0.2)	1,827 (100.0)	839	2,666	9.38	0.78
慢性腎盂腎炎 (%)	3 (4.1)		3 (4.1)		1 (1.4)	11 (15.1)	21 (28.8)	21 (28.8)	3 (4.1)	9 (12.3)	1 (1.4)				73 (100.0)	24	97	9.24	0.98
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (2.2)		1 (2.2)	1 (2.2)		9 (19.6)	12 (26.1)	13 (28.3)	2 (4.3)	7 (15.2)					46 (100.0)	15	61	9.33	0.72
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)				1 (5.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	7 (35.0)	5 (25.0)		3 (15.0)	1 (5.0)			1 (5.0)	20 (100.0)	4	24	9.54	0.86
その他の分類不能の腎炎 (%)		1 (1.9)		1 (1.9)		11 (20.8)	13 (24.5)	10 (18.9)	1 (1.9)	9 (17.0)	5 (9.4)	2 (3.8)			53 (100.0)	22	75	9.55	0.80
多発性嚢胞腎 (%)				10 (5.6)	6 (3.4)	29 (16.4)	55 (31.1)	40 (22.6)	8 (4.5)	18 (10.2)	7 (4.0)	3 (1.7)		1 (0.6)	177 (100.0)	95	272	9.39	0.69
腎硬化症 (%)	4 (0.5)	8 (1.1)	11 (1.5)	26 (3.5)	10 (1.3)	117 (15.8)	216 (29.1)	208 (28.1)	28 (3.8)	62 (8.4)	35 (4.7)	12 (1.6)	3 (0.4)	1 (0.1)	741 (100.0)	365	1,106	9.39	0.76
悪性高血圧 (%)		1 (1.4)	3 (4.3)	1 (1.4)	2 (2.9)	17 (24.3)	15 (21.4)	18 (25.7)	2 (2.9)	5 (7.1)	6 (8.6)				70 (100.0)	36	106	9.31	0.80
糖尿病性腎症 (%)	11 (0.6)	12 (0.7)	42 (2.3)	98 (5.4)	43 (2.4)	344 (18.8)	547 (29.9)	427 (23.3)	54 (3.0)	150 (8.2)	63 (3.4)	26 (1.4)	11 (0.6)	1 (0.1)	1,829 (100.0)	917	2,746	9.28	0.77
SLE腎炎 (%)				2 (6.3)	1 (3.1)	3 (9.4)	11 (34.4)	5 (15.6)		3 (9.4)	5 (15.6)	2 (6.3)			32 (100.0)	23	55	9.58	0.83
アミロイド腎 (%)		1 (8.3)		1 (8.3)	1 (8.3)	2 (16.7)	1 (8.3)	3 (25.0)		3 (25.0)					12 (100.0)	4	16	9.23	0.95
痛風腎 (%)	1 (6.3)	1 (6.3)		1 (6.3)	1 (6.3)	2 (12.5)	4 (25.0)	3 (18.8)		1 (6.3)	1 (6.3)	1 (6.3)			16 (100.0)	7	23	9.09	1.36
先天性代謝異常による腎不全 (%)	1 (7.7)					1 (7.7)	3 (23.1)	1 (7.7)		3 (23.1)	3 (23.1)	1 (7.7)			13 (100.0)	4	17	9.77	1.17
腎・尿路結核 (%)																1	1		
腎・尿路結石 (%)						4 (25.0)	4 (25.0)	4 (25.0)	1 (6.3)	2 (12.5)	1 (6.3)				16 (100.0)	5	21	9.53	0.60
腎・尿路腫瘍 (%)						1 (14.3)	1 (14.3)	4 (57.1)				1 (14.3)			7 (100.0)	5	12	9.66	0.67
閉塞性尿路障害 (%)			1 (8.3)			1 (8.3)	2 (16.7)	5 (41.7)		2 (16.7)	1 (8.3)				12 (100.0)	8	20	9.63	0.85
骨髄腫 (%)								1 (20.0)	1 (20.0)	2 (40.0)		1 (20.0)			5 (100.0)	2	7	10.36	0.62
腎形成不全 (%)			2 (4.7)	1 (2.3)	1 (2.3)	3 (7.0)	9 (20.9)	8 (18.6)	2 (4.7)	6 (14.0)	3 (7.0)	6 (14.0)	1 (2.3)	1 (2.3)	43 (100.0)	22	65	9.85	1.13
不明 (%)	1 (0.2)	4 (0.7)	15 (2.6)	26 (4.5)	7 (1.2)	94 (16.4)	176 (30.8)	148 (25.9)	18 (3.1)	48 (8.4)	19 (3.3)	11 (1.9)	4 (0.7)	1 (0.2)	572 (100.0)	317	889	9.37	0.76
再導入 (%)			1 (2.1)	6 (12.5)	1 (2.1)	8 (16.7)	12 (25.0)	8 (16.7)	3 (6.3)	4 (8.3)	2 (4.2)	1 (2.1)		2 (4.2)	48 (100.0)	17	65	9.39	1.01
その他 (%)	2 (1.2)			5 (3.0)	3 (1.8)	23 (14.0)	49 (29.9)	38 (23.2)	7 (4.3)	23 (14.0)	9 (5.5)	2 (1.2)	1 (0.6)	2 (1.2)	164 (100.0)	107	271	9.48	0.89
合計 (%)	36 (0.6)	38 (0.7)	122 (2.1)	249 (4.3)	110 (1.9)	984 (17.0)	1,664 (28.8)	1,453 (25.2)	195 (3.4)	535 (9.3)	248 (4.3)	97 (1.7)	31 (0.5)	14 (0.2)	5,776 (100.0)	2,839	8,615	9.36	0.79
記載なし (%)																			
総計 (%)	36 (0.6)	38 (0.7)	122 (2.1)	249 (4.3)	110 (1.9)	984 (17.0)	1,664 (28.8)	1,453 (25.2)	195 (3.4)	535 (9.3)	248 (4.3)	97 (1.7)	31 (0.5)	14 (0.2)	5,776 (100.0)	2,839	8,615	9.36	0.79

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D4053##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査