

表 1150 透析前リン濃度(mg/dL) 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	3未満	3.0~	3.5~	4.0~	4.5~	5.0~	5.5~	6.0~	6.1~	6.5~	7.0~	7.5~	8.0~	8.5~	9.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	
施設血液透析	9,757 (%)	10,993 (4.6)	18,994 (5.2)	26,706 (9.0)	31,644 (12.6)	31,754 (15.0)	26,812 (15.0)	4,544 (12.7)	15,586 (2.1)	13,529 (7.4)	8,264 (6.4)	5,017 (3.9)	2,963 (2.4)	1,892 (1.4)	3,046 (0.9)	211,501 (1.4)	22,203 (1.4)	233,704 (100.0)	5.16	1.44	
Off-line HDF	192 (%)	242 (4.5)	402 (5.7)	525 (9.5)	607 (12.4)	575 (14.3)	554 (13.6)	117 (13.1)	277 (2.8)	270 (6.5)	177 (6.4)	118 (4.2)	80 (2.8)	45 (1.9)	58 (1.1)	4,239 (1.4)	398 (100.0)	4,637 (100.0)	5.18	1.47	
On-line HDF	1,619 (%)	2,121 (3.0)	3,997 (3.9)	6,270 (7.4)	8,068 (11.6)	8,312 (15.0)	7,495 (15.4)	1,275 (13.9)	4,352 (2.4)	3,964 (8.1)	2,475 (7.4)	1,504 (4.6)	944 (2.8)	601 (1.8)	889 (1.1)	53,886 (1.6)	5,230 (100.0)	59,116 (100.0)	5.35	1.42	
Push/Pull HDF	2 (%)	3 (3.2)	6 (4.8)	10 (9.5)	11 (15.9)	9 (17.5)	3 (14.3)	3 (4.8)	5 (7.9)	5 (7.9)	1 (1.6)	2 (3.2)	4 (6.3)	1 (1.6)	1 (1.6)	63 (100.0)	3 (100.0)	66 (100.0)	5.28	1.56	
バイオフィルトレーション	11 (%)	12 (4.9)	13 (5.3)	39 (5.8)	27 (17.3)	34 (12.0)	37 (15.1)	5 (16.4)	16 (2.2)	14 (7.1)	8 (6.2)	4 (3.6)	1 (1.8)	3 (0.4)	1 (1.3)	1 (0.4)	225 (100.0)	27 (100.0)	252 (100.0)	5.10	1.32
IHDF	382 (%)	524 (3.8)	892 (5.1)	1,320 (8.8)	1,510 (13.0)	1,520 (14.8)	1,364 (14.9)	207 (13.4)	745 (2.0)	652 (7.3)	432 (6.4)	250 (4.2)	159 (2.5)	75 (1.6)	149 (0.7)	10,181 (1.5)	547 (100.0)	10,728 (100.0)	5.20	1.42	
血液濾過	1 (%)	3 (5.6)	2 (16.7)	4 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)	2 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)					1 (100.0)	1 (100.0)	18 (100.0)	5.05	1.52	
血液吸引透析 (リクセル等使用)	33 (%)	43 (2.6)	101 (3.4)	192 (7.9)	216 (15.0)	233 (16.8)	185 (18.2)	25 (14.4)	101 (2.0)	67 (7.9)	39 (5.2)	25 (3.0)	9 (2.0)	7 (0.7)	6 (0.5)	1,282 (0.5)	73 (100.0)	1,355 (100.0)	5.13	1.20	
在宅血液透析	63 (%)	28 (12.7)	60 (5.7)	65 (12.1)	78 (13.1)	69 (15.8)	52 (13.9)	3 (10.5)	25 (0.6)	23 (5.1)	14 (4.6)	8 (2.8)	1 (1.6)	4 (0.2)	2 (0.8)	495 (0.4)	122 (100.0)	617 (100.0)	4.67	1.43	
腹膜透析 (CAPD)	89 (%)	168 (2.7)	333 (5.1)	512 (10.0)	570 (15.4)	526 (17.1)	413 (15.8)	60 (12.4)	254 (1.8)	175 (7.6)	97 (5.3)	50 (2.9)	37 (1.5)	13 (1.1)	29 (0.4)	3,326 (0.9)	1,647 (100.0)	4,973 (100.0)	5.06	1.26	
腹膜透析 (APD)	46 (%)	75 (2.6)	128 (4.2)	207 (7.2)	280 (11.6)	278 (15.7)	247 (15.6)	55 (13.8)	163 (3.1)	120 (9.1)	85 (6.7)	36 (4.8)	27 (2.0)	17 (1.5)	20 (1.0)	1,784 (1.1)	853 (100.0)	2,637 (100.0)	5.32	1.34	
腹膜透析 (CCPD)	9 (%)	23 (1.3)	50 (3.3)	89 (7.2)	116 (12.7)	107 (16.6)	96 (15.3)	26 (13.7)	68 (3.7)	41 (9.7)	35 (5.9)	21 (5.0)	9 (3.0)	7 (1.3)	699 (0.3)	306 (1.0)	1,005 (1.0)	5.34	1.23		
合計	12,204 (%)	14,232 (4.2)	24,979 (4.9)	35,937 (8.7)	43,131 (12.5)	43,419 (15.0)	37,259 (15.1)	6,318 (13.0)	21,594 (2.2)	18,861 (7.5)	11,627 (6.6)	7,035 (4.0)	4,234 (2.4)	2,660 (1.5)	4,209 (0.9)	287,699 (1.5)	31,410 (100.0)	319,109 (100.0)	5.20	1.44	
記載なし																					
総計	12,204 (%)	14,232 (4.2)	24,979 (4.9)	35,937 (8.7)	43,131 (12.5)	43,419 (15.0)	37,259 (15.1)	6,318 (13.0)	21,594 (2.2)	18,861 (7.5)	11,627 (6.6)	7,035 (4.0)	4,234 (2.4)	2,660 (1.5)	4,209 (0.9)	287,699 (1.5)	31,410 (100.0)	319,109 (100.0)	5.20	1.44	

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のパック交換の両方を行うもの

##D4111##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査