

表 1157 透析前リン濃度(mg/dL) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	5,575	6,538	11,533	16,213	19,563	19,701	16,676	2,882	9,818	8,681	5,305	3,332	1,966	1,239	1,993	131,015	4,435	135,450	5.20	1.45
(%)	(4.3)	(5.0)	(8.8)	(12.4)	(14.9)	(15.0)	(12.7)	(2.2)	(7.5)	(6.6)	(4.0)	(2.5)	(1.5)	(0.9)	(1.5)	(100.0)				
女性	3,550	3,773	6,488	9,250	10,839	10,953	9,166	1,508	5,216	4,364	2,671	1,530	894	570	905	71,677	2,408	74,085	5.11	1.42
(%)	(5.0)	(5.3)	(9.1)	(12.9)	(15.1)	(15.3)	(12.8)	(2.1)	(7.3)	(6.1)	(3.7)	(2.1)	(1.2)	(0.8)	(1.3)	(100.0)				
合計	9,125	10,311	18,021	25,463	30,402	30,654	25,842	4,390	15,034	13,045	7,976	4,862	2,860	1,809	2,898	202,692	6,843	209,535	5.17	1.44
(%)	(4.5)	(5.1)	(8.9)	(12.6)	(15.0)	(15.1)	(12.7)	(2.2)	(7.4)	(6.4)	(3.9)	(2.4)	(1.4)	(0.9)	(1.4)	(100.0)				
記載なし																	1	1		
(%)																				
総計	9,125	10,311	18,021	25,463	30,402	30,654	25,842	4,390	15,034	13,045	7,976	4,862	2,860	1,809	2,898	202,692	6,844	209,536	5.17	1.44
(%)	(4.5)	(5.1)	(8.9)	(12.6)	(15.0)	(15.1)	(12.7)	(2.2)	(7.4)	(6.4)	(3.9)	(2.4)	(1.4)	(0.9)	(1.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D4120##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査