

表 1162 透析前リン濃度(mg/dL) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	3未満	3.0 ~	3.5 ~	4.0 ~	4.5 ~	5.0 ~	5.5 ~	6.0 ~	6.1 ~	6.5 ~	7.0 ~	7.5 ~	8.0 ~	8.5 ~	9.0 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	1,292 (%)	1,762 (4.1)	3,246 (7.5)	5,092 (11.8)	6,269 (14.5)	6,531 (15.2)	5,942 (13.8)	1,008 (2.3)	3,429 (8.0)	3,165 (7.3)	2,019 (4.7)	1,263 (2.9)	806 (1.9)	509 (1.2)	762 (1.8)	43,095 (100.0)	1,050 607	44,145 24,229	5.36	1.44
女性	851 (%)	1,048 (4.4)	1,907 (8.1)	2,823 (12.0)	3,670 (15.5)	3,637 (15.4)	3,266 (13.8)	553 (2.3)	1,845 (7.8)	1,613 (6.8)	1,003 (4.2)	568 (2.4)	344 (1.5)	196 (0.8)	298 (1.3)	23,622 (100.0)			5.24	1.38
合計	2,143 (%)	2,810 (4.2)	5,153 (7.7)	7,915 (11.9)	9,939 (14.9)	10,168 (15.2)	9,208 (13.8)	1,561 (2.3)	5,274 (7.9)	4,778 (7.2)	3,022 (4.5)	1,831 (2.7)	1,150 (1.7)	705 (1.1)	1,060 (1.6)	66,717 (100.0)	1,657	68,374	5.32	1.42
記載なし (%)																				
総計	2,143 (%)	2,810 (4.2)	5,153 (7.7)	7,915 (11.9)	9,939 (14.9)	10,168 (15.2)	9,208 (13.8)	1,561 (2.3)	5,274 (7.9)	4,778 (7.2)	3,022 (4.5)	1,831 (2.7)	1,150 (1.7)	705 (1.1)	1,060 (1.6)	66,717 (100.0)	1,657	68,374	5.32	1.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D4130##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査