

表 1165 透析前リソルビン濃度(mg/dL) 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	3未満	3.0~	3.5~	4.0~	4.5~	5.0~	5.5~	6.0~	6.1~	6.5~	7.0~	7.5~	8.0~	8.5~	9.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性系球体腎炎	607 (%)	826 (3.8)	1,579 (7.2)	2,467 (11.3)	3,269 (14.9)	3,478 (15.9)	3,225 (14.7)	545 (2.5)	1,804 (8.2)	1,605 (7.3)	969 (4.4)	584 (2.7)	357 (1.6)	231 (1.1)	328 (1.5)	21,874 (100.0)	514	22,388	5.35	1.39
慢性腎孟腎炎	23 (%)	31 (5.1)	41 (6.7)	88 (14.4)	92 (15.1)	89 (14.6)	71 (11.7)	20 (3.3)	34 (5.6)	46 (7.6)	33 (5.4)	16 (2.6)	5 (0.8)	11 (1.8)	9 (1.5)	609 (100.0)	18	627	5.25	1.44
急速進行性系球体腎炎	14 (%)	26 (2.9)	39 (5.4)	63 (8.2)	79 (13.2)	72 (16.5)	54 (15.1)	9 (11.3)	37 (1.9)	37 (7.7)	19 (4.0)	12 (2.5)	3 (0.6)	6 (1.3)	8 (1.7)	478 (100.0)	6	484	5.23	1.40
妊娠腎/妊娠中毒症	15 (%)	17 (3.4)	35 (3.8)	48 (7.8)	68 (10.7)	57 (15.2)	64 (12.8)	11 (14.3)	39 (2.5)	41 (8.7)	41 (9.2)	45 (4.5)	25 (2.5)	7 (1.6)	9 (1.1)	447 (2.0)	12	459	5.38	1.42
その他の分類不能の腎炎	12 (%)	13 (3.5)	25 (3.8)	31 (7.2)	43 (9.0)	41 (12.4)	60 (11.8)	7 (17.3)	43 (2.0)	28 (12.4)	13 (8.1)	10 (3.8)	7 (2.9)	7 (2.0)	7 (1.7)	346 (2.0)	9	355	5.49	1.47
多発性囊胞腎	60 (%)	74 (2.4)	150 (2.9)	282 (6.0)	353 (11.2)	410 (14.0)	409 (16.3)	54 (16.2)	228 (2.1)	202 (9.1)	150 (8.0)	51 (6.0)	36 (2.0)	24 (1.4)	35 (1.0)	2,518 (1.4)	51	2,569	5.43	1.32
腎硬化症	221 (%)	286 (3.8)	531 (5.0)	748 (9.2)	874 (13.0)	902 (15.2)	713 (15.7)	116 (12.4)	410 (2.0)	374 (7.1)	237 (6.5)	135 (4.1)	79 (2.3)	51 (1.4)	81 (0.9)	5,758 (1.4)	138	5,896	5.18	1.43
悪性高血圧	17 (%)	16 (3.1)	26 (3.0)	65 (4.8)	61 (12.0)	84 (11.3)	74 (15.5)	11 (13.7)	59 (2.0)	26 (10.9)	41 (7.6)	25 (4.8)	12 (4.6)	7 (2.2)	17 (1.3)	541 (3.1)	14	555	5.59	1.53
糖尿病性腎症	816 (%)	1,048 (3.4)	1,915 (4.4)	2,922 (8.0)	3,578 (12.2)	3,510 (15.0)	3,174 (14.7)	549 (13.3)	1,796 (2.3)	1,719 (7.5)	1,069 (7.2)	700 (4.5)	463 (2.9)	243 (1.9)	388 (1.0)	23,890 (1.6)	626	24,516	5.30	1.45
SLE腎炎	15 (%)	24 (2.9)	34 (4.6)	61 (6.5)	77 (11.7)	85 (14.8)	80 (16.3)	24 (15.4)	42 (3.3)	24 (8.1)	23 (4.6)	14 (4.4)	9 (2.7)	9 (1.7)	6 (1.2)	520 (1.0)	17	537	5.33	1.42
アミロイド腎	1 (%)	1 (1.1)	11 (11.6)	17 (17.9)	13 (13.7)	18 (18.9)	12 (12.6)	1 (1.1)	7 (7.4)	5 (5.3)	7 (7.4)	1 (1.1)	1 (1.1)	95 (1.0)	98 (1.0)	95 (1.0)	3	98	5.17	1.17
痛風腎	8 (%)	7 (3.6)	23 (3.2)	34 (10.4)	31 (15.3)	34 (14.0)	31 (15.3)	9 (4.1)	19 (8.6)	20 (9.0)	15 (6.8)	5 (2.3)	5 (2.3)	5 (2.3)	222 (2.3)	5	227	5.50	1.43	
先天性代謝異常による腎不全	1 (%)	1 (1.4)	4 (1.4)	11 (5.6)	7 (15.5)	6 (9.9)	16 (22.5)	1 (8.5)	2 (1.4)	8 (2.8)	3 (11.3)	5 (4.2)	5 (7.0)	1 (7.0)	71 (1.4)	71 (1.0)	2	73	5.67	1.43
腎・尿路結核	2 (%)	4 (4.7)	6 (9.3)	10 (14.0)	2 (23.3)	6 (14.0)	2 (4.7)	2 (2.3)	3 (7.0)	3 (7.0)	1 (7.0)	1 (2.3)	1 (2.3)	4 (9.3)	43 (10.0)	1	44	5.28	1.47	
腎・尿路結石	3 (%)	3 (2.8)	9 (2.8)	14 (8.4)	17 (13.1)	21 (15.9)	11 (19.6)	1 (10.3)	9 (0.9)	7 (8.4)	3 (6.5)	5 (2.8)	2 (4.7)	2 (1.9)	107 (1.9)	6	113	5.27	1.36	
腎・尿路腫瘍	6 (%)	10 (3.2)	11 (5.4)	26 (5.9)	21 (14.0)	39 (11.3)	21 (21.0)	7 (11.3)	18 (3.8)	10 (9.7)	9 (5.4)	3 (4.8)	1 (1.6)	1 (0.5)	186 (0.5)	4	190	5.22	1.26	
閉塞性尿路障害	6 (%)	7 (4.0)	18 (4.7)	19 (12.0)	14 (12.7)	28 (9.3)	17 (18.7)	1 (11.3)	10 (0.7)	9 (6.7)	9 (6.0)	7 (4.7)	5 (3.3)	4 (2.7)	150 (3.3)	1	151	5.29	1.63	
骨髄腫	3 (%)	3 (8.6)	2 (8.6)	2 (5.7)	6 (5.7)	3 (17.1)	6 (8.6)	1 (17.1)	5 (2.9)	1 (14.3)	1 (2.9)	1 (2.9)	1 (2.9)	1 (2.9)	35 (100.0)	2	37	5.10	1.43	
腎形成不全	4 (%)	6 (2.4)	7 (3.6)	20 (4.2)	16 (11.9)	23 (9.5)	25 (13.7)	5 (14.9)	9 (3.0)	16 (5.4)	14 (9.5)	7 (8.3)	5 (4.2)	6 (3.0)	168 (3.0)	3	171	5.77	1.61	
不明	232 (%)	306 (3.7)	530 (4.8)	749 (8.3)	970 (11.8)	930 (15.3)	851 (14.6)	151 (13.4)	514 (8.1)	407 (6.4)	270 (4.3)	156 (4.3)	106 (2.5)	74 (1.7)	105 (1.2)	6,351 (1.0)	180	6,531	5.27	1.45
再導入	13 (%)	19 (2.1)	32 (3.1)	57 (5.2)	89 (9.2)	95 (14.4)	96 (15.3)	14 (2.3)	50 (8.1)	57 (9.2)	39 (6.3)	26 (4.2)	13 (2.1)	14 (1.0)	620 (2.3)	13	633	5.60	1.46	
その他	64 (%)	86 (3.8)	143 (5.1)	196 (8.5)	248 (11.6)	230 (14.7)	203 (13.6)	30 (12.0)	136 (1.8)	118 (8.1)	94 (7.0)	59 (5.6)	30 (3.5)	17 (1.8)	34 (1.0)	1,688 (2.0)	32	1,720	5.32	1.51
合計	2,143 (%)	2,810 (4.2)	5,153 (7.7)	7,915 (11.9)	9,939 (14.9)	10,168 (15.2)	9,208 (13.8)	1,561 (2.3)	5,274 (7.9)	4,778 (4.5)	3,022 (2.7)	1,831 (1.7)	1,150 (1.1)	705 (1.1)	1,060 (1.6)	66,717 (100.0)	1,657	68,374	5.32	1.42
記載なし	(%)																			
総計	2,143 (%)	2,810 (4.2)	5,153 (7.7)	7,915 (11.9)	9,939 (14.9)	10,168 (15.2)	9,208 (13.8)	1,561 (2.3)	5,274 (7.9)	4,778 (4.5)	3,022 (2.7)	1,831 (1.7)	1,150 (1.7)	705 (1.1)	1,060 (1.6)	66,717 (100.0)	1,657	68,374	5.32	1.42

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D4133#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査