

表 1167 リン濃度(mg/dL) 性別(腹膜透析患者)

性別	3未満	3.0~	3.5~	4.0~	4.5~	5.0~	5.5~	6.0~	6.1~	6.5~	7.0~	7.5~	8.0~	8.5~	9.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	85 (%)	176 (4.7)	341 (9.0)	493 (13.0)	618 (16.3)	610 (16.1)	490 (13.0)	102 (2.7)	321 (8.5)	211 (5.6)	150 (4.0)	79 (2.1)	47 (1.2)	21 (0.6)	39 (1.0)	3,783 (100.0)	1,819 987	5,602 3,013	5.20 5.13	1.29 1.28
女性	59 (%)	90 (4.4)	170 (8.4)	315 (15.5)	348 (17.2)	301 (14.9)	266 (13.1)	39 (1.9)	164 (8.1)	125 (6.2)	67 (3.3)	28 (1.4)	26 (1.3)	11 (0.5)	17 (0.8)	2,026 (100.0)				
合計	144 (%)	266 (4.6)	511 (8.8)	808 (13.9)	966 (16.6)	911 (15.7)	756 (13.0)	141 (2.4)	485 (8.3)	336 (5.8)	217 (3.7)	107 (1.8)	73 (1.3)	32 (0.6)	56 (1.0)	5,809 (100.0)	2,806 2,806	8,615 8,615	5.17 5.17	1.29 1.29
記載なし (%)																				
総計	144 (%)	266 (4.6)	511 (8.8)	808 (13.9)	966 (16.6)	911 (15.7)	756 (13.0)	141 (2.4)	485 (8.3)	336 (5.8)	217 (3.7)	107 (1.8)	73 (1.3)	32 (0.6)	56 (1.0)	5,809 (100.0)	2,806 2,806	8,615 8,615	5.17 5.17	1.29 1.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4140##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査