

表 1170 リン濃度(mg/dL) 原疾患別(腹膜透析患者)

原疾患	3未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.1～	6.5～	7.0～	7.5～	8.0～	8.5～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	29 (1.6)	61 (3.3)	141 (7.7)	260 (14.2)	301 (16.4)	305 (16.6)	276 (15.0)	41 (2.2)	164 (8.9)	106 (5.8)	60 (3.3)	41 (2.2)	16 (0.9)	12 (0.7)	22 (1.2)	1,835 (100.0)	831	2,666	5.26	1.25
慢性腎盂腎炎 (%)	3 (4.1)	3 (4.1)	11 (15.1)	8 (11.0)	11 (15.1)	10 (13.7)	7 (9.6)	2 (2.7)	6 (8.2)	3 (4.1)	3 (4.1)	1 (1.4)	3 (4.1)		2 (2.7)	73 (100.0)	24	97	5.23	1.60
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (2.2)	5 (10.9)	2 (4.3)	6 (13.0)	4 (8.7)	11 (23.9)	5 (10.9)	1 (2.2)	6 (13.0)	2 (4.3)	2 (4.3)		1 (2.2)			46 (100.0)	15	61	5.12	1.19
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1 (5.0)	2 (10.0)		2 (10.0)	5 (25.0)	2 (10.0)	2 (10.0)		4 (20.0)	1 (5.0)					1 (5.0)	20 (100.0)	4	24	5.19	1.57
その他の分類不能の腎炎 (%)	1 (1.9)	1 (1.9)	8 (15.4)	7 (13.5)	4 (7.7)	7 (13.5)	2 (3.8)	2 (3.8)	9 (17.3)	2 (3.8)	3 (5.8)	3 (5.8)	1 (1.9)		2 (3.8)	52 (100.0)	23	75	5.56	1.67
多発性嚢胞腎 (%)	1 (0.6)	1 (0.6)	23 (12.7)	22 (12.2)	29 (16.0)	34 (18.8)	17 (9.4)	4 (2.2)	16 (8.8)	11 (6.1)	10 (5.5)	6 (3.3)	4 (2.2)	1 (0.6)	2 (1.1)	181 (100.0)	91	272	5.36	1.29
腎硬化症 (%)	25 (3.3)	51 (6.8)	71 (9.5)	122 (16.3)	116 (15.5)	114 (15.2)	100 (13.4)	23 (3.1)	53 (7.1)	31 (4.1)	15 (2.0)	10 (1.3)	11 (1.5)	4 (0.5)	3 (0.4)	749 (100.0)	357	1,106	4.98	1.23
悪性高血圧 (%)	3 (4.3)	5 (7.2)	5 (7.2)	12 (17.4)	11 (15.9)	12 (17.4)	8 (11.6)		7 (10.1)	2 (2.9)	3 (4.3)	1 (1.4)				69 (100.0)	37	106	4.92	1.15
糖尿病性腎症 (%)	50 (2.7)	90 (4.9)	156 (8.5)	232 (12.6)	325 (17.7)	289 (15.7)	229 (12.4)	48 (2.6)	133 (7.2)	120 (6.5)	87 (4.7)	33 (1.8)	24 (1.3)	10 (0.5)	14 (0.8)	1,840 (100.0)	906	2,746	5.18	1.29
SLE腎炎 (%)	2 (6.3)	2 (6.3)	6 (18.8)	4 (12.5)		6 (18.8)	4 (12.5)	1 (3.1)	3 (9.4)	2 (6.3)	2 (6.3)					32 (100.0)	23	55	4.95	1.30
アミロイド腎 (%)	1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	3 (25.0)			2 (16.7)		2 (16.7)		1 (8.3)		1 (8.3)			12 (100.0)	4	16	5.08	1.73
痛風腎 (%)		3 (18.8)	1 (6.3)	1 (6.3)	3 (18.8)	1 (6.3)	1 (6.3)		3 (18.8)		3 (18.8)					16 (100.0)	7	23	5.17	1.45
先天性代謝異常による腎不全 (%)			1 (7.7)	1 (7.7)	2 (15.4)	3 (23.1)	2 (15.4)		1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)				13 (100.0)	4	17	5.51	1.14
腎・尿路結核 (%)																	1	1		
腎・尿路結石 (%)		1 (6.3)	2 (12.5)	5 (31.3)	4 (25.0)	1 (6.3)			2 (12.5)	1 (6.3)						16 (100.0)	5	21	4.72	0.96
腎・尿路腫瘍 (%)			1 (12.5)	1 (12.5)		1 (12.5)			2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)					8 (100.0)	4	12	5.56	1.23
閉塞性尿路障害 (%)		1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	4 (33.3)		2 (16.7)		1 (8.3)	2 (16.7)						12 (100.0)	8	20	5.15	1.15
骨髄腫 (%)		1 (20.0)		1 (20.0)		1 (20.0)			1 (20.0)		1 (20.0)					5 (100.0)	2	7	5.26	1.68
腎形成不全 (%)		5 (11.6)	3 (7.0)	2 (4.7)	7 (16.3)	2 (4.7)	7 (16.3)	2 (4.7)	4 (9.3)	3 (7.0)	5 (11.6)		2 (4.7)		1 (2.3)	43 (100.0)	22	65	5.54	1.50
不明 (%)	18 (3.1)	26 (4.5)	57 (9.9)	80 (14.0)	109 (19.0)	88 (15.4)	66 (11.5)	12 (2.1)	43 (7.5)	37 (6.5)	13 (2.3)	7 (1.2)	6 (1.0)	3 (0.5)	8 (1.4)	573 (100.0)	316	889	5.09	1.30
再導入 (%)		3 (6.1)	6 (12.2)	8 (16.3)	5 (10.2)	3 (6.1)	7 (14.3)	2 (4.1)	6 (12.2)	2 (4.1)	5 (10.2)	2 (4.1)				49 (100.0)	16	65	5.32	1.33
その他 (%)	9 (5.5)	4 (2.4)	15 (9.1)	30 (18.2)	26 (15.8)	21 (12.7)	18 (10.9)	3 (1.8)	19 (11.5)	9 (5.5)	2 (1.2)	2 (1.2)	4 (2.4)	2 (1.2)	1 (0.6)	165 (100.0)	106	271	5.06	1.36
合計 (%)	144 (2.5)	266 (4.6)	511 (8.8)	808 (13.9)	966 (16.6)	911 (15.7)	756 (13.0)	141 (2.4)	485 (8.3)	336 (5.8)	217 (3.7)	107 (1.8)	73 (1.3)	32 (0.6)	56 (1.0)	5,809 (100.0)	2,806	8,615	5.17	1.29
記載なし (%)																				
総計 (%)	144 (2.5)	266 (4.6)	511 (8.8)	808 (13.9)	966 (16.6)	911 (15.7)	756 (13.0)	141 (2.4)	485 (8.3)	336 (5.8)	217 (3.7)	107 (1.8)	73 (1.3)	32 (0.6)	56 (1.0)	5,809 (100.0)	2,806	8,615	5.17	1.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4143##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査