

表 1178 PTH値(pg/mL) 原疾患別（透析患者全体）PTH測定法:intact-PTH

原疾患	20未満	20～	40～	60～	80～	100～	120～	140～	160～	180～	240～	241～	300～	360～	420～	480～	500～	540～	600～	800～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	3,399 (4.7)	4,460 (6.2)	4,928 (6.8)	5,287 (7.3)	5,660 (7.9)	5,536 (7.7)	5,424 (7.5)	5,079 (7.0)	4,545 (6.3)	10,512 (14.6)	131 (0.2)	6,393 (8.9)	3,636 (5.0)	2,144 (3.0)	1,357 (1.9)	342 (0.5)	536 (0.7)	614 (0.9)	1,144 (1.6)	974 (1.4)	72,101 (100.0)	1,318	73,419	186.63	191.64
慢性腎盂腎炎 (%)	114 (5.1)	125 (5.6)	170 (7.7)	185 (8.3)	186 (8.4)	178 (8.0)	159 (7.2)	127 (5.7)	136 (6.1)	304 (13.7)	5 (0.2)	183 (8.2)	118 (5.3)	66 (3.0)	51 (2.3)	12 (0.5)	17 (0.8)	26 (1.2)	28 (1.3)	31 (1.4)	2,221 (100.0)	56	2,277	183.56	175.44
急速進行性糸球体腎炎 (%)	73 (3.8)	130 (6.8)	147 (7.7)	181 (9.5)	151 (7.9)	154 (8.1)	151 (7.9)	128 (6.7)	138 (7.2)	286 (15.0)	5 (0.3)	162 (8.5)	66 (3.5)	52 (2.7)	30 (1.6)	3 (0.2)	13 (0.7)	10 (0.5)	15 (0.8)	17 (0.9)	1,912 (100.0)	38	1,950	168.66	161.09
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	75 (6.3)	66 (5.5)	87 (7.3)	92 (7.7)	94 (7.9)	95 (7.9)	109 (9.1)	68 (5.7)	71 (5.9)	161 (13.5)	4 (0.3)	84 (7.0)	68 (5.7)	29 (2.4)	20 (1.7)	3 (0.3)	15 (1.3)	15 (1.3)	20 (1.7)	20 (1.7)	1,196 (100.0)	14	1,210	188.43	213.67
その他の分類不能の腎炎 (%)	49 (4.2)	73 (6.2)	53 (4.5)	86 (7.4)	95 (8.1)	94 (8.0)	89 (7.6)	75 (6.4)	78 (6.7)	169 (14.4)	3 (0.3)	105 (9.0)	73 (6.2)	40 (3.4)	19 (1.6)	7 (0.6)	8 (0.7)	12 (1.0)	26 (2.2)	16 (1.4)	1,170 (100.0)	21	1,191	200.62	236.25
多発性嚢胞腎 (%)	326 (3.6)	533 (5.9)	613 (6.8)	683 (7.6)	697 (7.7)	689 (7.6)	717 (8.0)	651 (7.2)	596 (6.6)	1,381 (15.3)	18 (0.2)	798 (8.9)	452 (5.0)	250 (2.8)	180 (2.0)	41 (0.5)	70 (0.8)	91 (1.0)	114 (1.3)	109 (1.2)	9,009 (100.0)	196	9,205	185.95	184.52
腎硬化症 (%)	845 (3.4)	1,557 (6.3)	1,748 (7.1)	1,971 (8.0)	2,057 (8.4)	1,962 (8.0)	1,900 (7.7)	1,719 (7.0)	1,605 (6.5)	3,721 (15.2)	46 (0.2)	2,193 (8.9)	1,214 (4.9)	660 (2.7)	405 (1.6)	109 (0.4)	166 (0.7)	171 (0.7)	269 (1.1)	230 (0.9)	24,548 (100.0)	585	25,133	176.95	162.66
悪性高血圧 (%)	66 (3.2)	102 (5.0)	148 (7.3)	145 (7.1)	160 (7.9)	178 (8.7)	143 (7.0)	147 (7.2)	147 (7.2)	302 (14.8)	6 (0.3)	172 (8.5)	112 (5.5)	69 (3.4)	38 (1.9)	3 (0.1)	17 (0.8)	15 (0.7)	32 (1.6)	33 (1.6)	2,035 (100.0)	45	2,080	190.42	178.18
糖尿病性腎症 (%)	4,040 (4.2)	6,644 (6.9)	7,178 (7.5)	7,523 (7.8)	7,907 (8.2)	7,584 (7.9)	7,579 (7.9)	7,041 (7.3)	6,264 (6.5)	14,220 (14.8)	185 (0.2)	8,292 (8.6)	4,606 (4.8)	2,535 (2.6)	1,481 (1.5)	349 (0.4)	553 (0.6)	603 (0.6)	946 (1.0)	587 (0.6)	96,117 (100.0)	2,337	98,454	168.55	144.53
SLE腎炎 (%)	97 (5.7)	133 (7.8)	159 (9.3)	149 (8.7)	112 (6.6)	134 (7.8)	140 (8.2)	121 (7.1)	87 (5.1)	223 (13.0)	3 (0.2)	125 (7.3)	88 (5.1)	43 (2.5)	19 (1.1)	10 (0.6)	12 (0.7)	16 (0.9)	23 (1.3)	15 (0.9)	1,709 (100.0)	32	1,741	166.33	153.27
アミロイド腎 (%)	15 (4.6)	32 (9.9)	22 (6.8)	26 (8.0)	25 (7.7)	25 (7.7)	21 (6.5)	34 (10.5)	21 (6.5)	44 (13.6)	19 (5.9)	19 (5.9)	4 (1.2)	3 (0.9)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (1.2)	4 (0.9)	3 (1.2)	4 (1.0)	323 (100.0)	8	331	164.97	159.73
痛風腎 (%)	39 (4.6)	41 (4.9)	53 (6.3)	68 (8.1)	62 (7.4)	66 (7.9)	64 (7.6)	64 (7.6)	56 (6.7)	109 (13.0)	69 (8.2)	51 (6.1)	27 (3.2)	25 (3.0)	8 (1.0)	3 (0.4)	9 (1.1)	12 (1.4)	13 (1.5)	839 (100.0)	19	858	197.54	230.05	
先天性代謝異常による腎不全 (%)	13 (6.0)	12 (5.6)	12 (5.6)	16 (7.4)	14 (6.5)	16 (7.4)	16 (7.4)	18 (8.3)	13 (6.0)	28 (13.0)	1 (0.5)	16 (7.4)	13 (6.0)	8 (3.7)	6 (2.8)	2 (0.9)	2 (0.9)	4 (1.9)	6 (2.8)	216 (100.0)	4	220	189.17	151.54	
腎・尿路結核 (%)	12 (9.4)	11 (8.6)	9 (7.0)	10 (7.8)	8 (6.3)	13 (10.2)	9 (7.0)	5 (3.9)	10 (7.8)	20 (15.6)	8 (6.3)	6 (4.7)	5 (3.9)	1 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	128 (100.0)	3	131	143.65	108.63	
腎・尿路結石 (%)	17 (3.8)	31 (6.9)	29 (6.4)	29 (6.4)	42 (9.3)	43 (9.5)	37 (8.2)	26 (5.8)	25 (5.5)	67 (14.8)	46 (10.2)	23 (5.1)	13 (2.9)	5 (1.1)	2 (0.4)	4 (0.9)	1 (0.2)	8 (1.8)	4 (0.9)	452 (100.0)	14	466	177.64	160.17	
腎・尿路腫瘍 (%)	27 (3.6)	35 (4.7)	47 (6.3)	57 (7.6)	78 (10.4)	65 (8.7)	57 (7.6)	48 (6.4)	43 (5.8)	109 (14.6)	3 (0.4)	63 (8.4)	38 (5.1)	21 (2.8)	15 (2.0)	5 (0.7)	11 (1.5)	6 (0.8)	14 (1.9)	5 (0.7)	747 (100.0)	14	761	183.15	152.87
閉塞性尿路障害 (%)	25 (4.4)	34 (6.0)	36 (6.3)	47 (8.3)	40 (7.1)	41 (7.2)	49 (8.6)	26 (4.6)	33 (5.8)	94 (16.6)	46 (8.1)	35 (6.2)	21 (3.7)	9 (1.6)	2 (0.4)	4 (0.7)	4 (0.7)	11 (1.9)	10 (1.8)	567 (100.0)	12	579	196.17	221.30	
骨髄腫 (%)	11 (4.6)	18 (7.6)	22 (9.3)	19 (8.0)	13 (5.5)	17 (7.2)	20 (8.4)	18 (7.6)	9 (3.8)	49 (20.7)	2 (0.8)	16 (6.8)	12 (5.1)	3 (1.3)	2 (0.8)	2 (0.8)	1 (0.4)	3 (1.3)	237 (100.0)	5	242	158.26	120.97		
腎形成不全 (%)	21 (4.1)	38 (7.4)	39 (7.6)	20 (3.9)	36 (7.0)	31 (6.0)	35 (6.8)	29 (5.6)	32 (6.2)	72 (14.0)	2 (0.4)	63 (12.2)	28 (5.4)	15 (2.9)	13 (2.5)	3 (0.6)	6 (1.2)	5 (1.0)	12 (2.3)	15 (2.9)	515 (100.0)	7	522	218.79	233.21
不明 (%)	971 (4.0)	1,530 (6.3)	1,760 (7.3)	1,936 (8.0)	1,996 (8.2)	1,881 (7.8)	1,881 (7.8)	1,690 (7.0)	1,498 (6.2)	3,522 (14.5)	56 (0.2)	2,111 (8.7)	1,154 (4.8)	735 (3.0)	435 (1.8)	97 (0.4)	180 (0.7)	205 (0.8)	318 (1.3)	304 (1.3)	24,260 (100.0)	578	24,838	182.72	187.38
再導入 (%)	94 (5.7)	113 (6.9)	102 (6.2)	126 (7.7)	125 (7.6)	119 (7.2)	110 (6.7)	107 (6.5)	110 (6.7)	202 (12.3)	1 (0.1)	155 (9.4)	91 (5.5)	48 (2.9)	34 (2.1)	12 (0.7)	9 (0.5)	12 (0.7)	34 (2.1)	38 (2.3)	1,642 (100.0)	23	1,665	195.15	199.75
その他 (%)	275 (4.3)	437 (6.8)	457 (7.1)	487 (7.6)	499 (7.8)	519 (8.1)	496 (7.7)	431 (6.7)	417 (6.5)	912 (14.2)	15 (0.2)	567 (8.8)	294 (4.6)	177 (2.8)	130 (2.0)	35 (0.5)	49 (0.8)	45 (0.7)	90 (1.4)	95 (1.5)	6,427 (100.0)	196	6,623	183.62	184.46
合計 (%)	10,604 (4.3)	16,155 (6.5)	17,819 (7.2)	19,143 (7.7)	20,057 (8.1)	19,440 (7.8)	19,206 (7.7)	17,652 (7.1)	15,934 (6.4)	36,507 (14.7)	486 (0.2)	21,686 (8.7)	12,197 (4.9)	6,965 (2.8)	4,278 (1.7)	1,049 (0.4)	1,676 (0.7)	1,869 (0.8)	3,128 (1.3)	2,520 (1.0)	248,371 (100.0)	5,525	253,896	178.07	170.93
記載なし (%)																									
総計 (%)	10,604 (4.3)	16,155 (6.5)	17,819 (7.2)	19,143 (7.7)	20,057 (8.1)	19,440 (7.8)	19,206 (7.7)	17,652 (7.1)	15,934 (6.4)	36,507 (14.7)	486 (0.2)	21,686 (8.7)	12,197 (4.9)	6,965 (2.8)	4,278 (1.7)	1,049 (0.4)	1,676 (0.7)	1,869 (0.8)	3,128 (1.3)	2,520 (1.0)	248,371 (100.0)	5,525	253,896	178.07	170.93

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4216##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査