

表 1206 PTH値(pg/mL) 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回) PTH測定法:whole-PTH

| 原疾患 | 20未満 | 20~ | 35~ | 50~ | 75~ | 100~ | 125~ | 150~ | 180~ | 210~ | 240~ | 300~ | 350~ | 400~ | 500~ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 | |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 慢性糸球体腎炎 | 361 (8.2) | 432 (9.8) | 440 (10.0) | 719 (16.4) | 611 (13.9) | 469 (10.7) | 349 (8.0) | 14 (0.3) | 237 (5.4) | 182 (4.1) | 148 (3.4) | 164 (3.7) | 80 (1.8) | 44 (1.0) | 57 (1.3) | 80 (1.8) | 4,387 (100.0) | 103 | 4,490 | 117.27 | 130.68 |
| 慢性腎孟腎炎 | 16 (8.5) | 25 (13.2) | 20 (10.6) | 32 (16.9) | 24 (12.7) | 22 (11.6) | 16 (8.5) | 6 (3.2) | 8 (4.2) | 7 (3.7) | 6 (3.2) | 2 (1.1) | 2 (1.1) | 1 (1.1) | 1 (0.5) | 1 (100.0) | 6 | 195 | 100.18 | 88.08 | |
| 急速進行性糸球体腎炎 | 20 (12.7) | 22 (13.9) | 15 (9.5) | 21 (13.3) | 30 (19.0) | 12 (7.6) | 9 (5.7) | 12 (7.6) | 6 (3.8) | 6 (2.5) | 4 (1.9) | 3 (0.6) | 1 (1.9) | 3 (0.6) | 3 (1.9) | 158 (100.0) | 2 | 160 | 93.20 | 83.87 | |
| 妊娠腎/妊娠中毒症 | 4 (5.1) | 9 (11.4) | 13 (16.5) | 12 (15.2) | 12 (15.2) | 6 (7.6) | 6 (7.6) | 5 (6.3) | 3 (3.8) | 1 (1.3) | 4 (5.1) | 1 (5.1) | 1 (1.3) | 1 (3.8) | 3 (100.0) | 1 | 80 | 123.16 | 177.13 | | |
| その他の分類不能の腎炎 | 6 (8.2) | 4 (5.5) | 4 (5.5) | 10 (13.7) | 8 (17.8) | 13 (11.0) | 8 (5.5) | 1 (1.4) | 5 (6.8) | 4 (5.5) | 1 (1.4) | 5 (6.8) | 3 (4.1) | 1 (1.4) | 4 (5.5) | 4 (100.0) | 1 | 74 | 158.38 | 192.47 | |
| 多発性囊胞腎 | 58 (9.2) | 60 (9.5) | 62 (9.8) | 93 (14.7) | 82 (13.0) | 50 (7.9) | 65 (10.3) | 3 (0.5) | 36 (5.7) | 43 (6.8) | 18 (2.8) | 26 (4.1) | 17 (2.7) | 10 (1.6) | 6 (0.9) | 4 (0.6) | 633 (100.0) | 9 | 642 | 117.11 | 132.96 |
| 腎硬化症 | 118 (6.9) | 210 (12.3) | 200 (11.7) | 274 (16.0) | 229 (13.4) | 174 (10.2) | 129 (7.5) | 7 (0.4) | 101 (5.9) | 81 (4.7) | 58 (3.4) | 60 (3.5) | 22 (1.3) | 15 (0.9) | 11 (0.6) | 21 (1.2) | 21 (100.0) | 38 | 1,748 | 107.90 | 110.83 |
| 悪性高血圧 | 19 (11.4) | 22 (13.3) | 18 (10.8) | 15 (9.0) | 22 (13.3) | 18 (10.8) | 14 (8.4) | 1 (0.6) | 11 (6.6) | 5 (3.0) | 5 (3.0) | 8 (4.8) | 2 (1.2) | 2 (0.6) | 1 (0.6) | 4 (2.4) | 166 (100.0) | 2 | 168 | 114.78 | 138.96 |
| 糖尿病性腎症 | 477 (7.7) | 644 (10.4) | 674 (10.9) | 998 (16.2) | 857 (13.9) | 773 (12.5) | 511 (8.3) | 16 (0.3) | 380 (6.2) | 273 (4.4) | 151 (2.4) | 180 (2.9) | 83 (1.3) | 47 (0.8) | 64 (1.0) | 38 (0.6) | 6,166 (100.0) | 161 | 6,327 | 103.94 | 94.05 |
| SLE腎炎 | 7 (5.8) | 15 (12.5) | 19 (15.8) | 13 (10.8) | 22 (18.3) | 12 (10.0) | 4 (3.3) | 6 (5.0) | 4 (4.2) | 2 (3.3) | 5 (1.7) | 4 (4.2) | 2 (0.8) | 1 (0.8) | 1 (0.8) | 4 (3.3) | 120 (100.0) | 1 | 121 | 130.52 | 217.17 |
| アミロイド腎 | 3 (10.3) | 7 (24.1) | 3 (10.3) | 5 (17.2) | 3 (10.3) | 3 (10.3) | 2 (6.9) | 1 (3.4) | 1 (3.4) | 1 (3.4) | 1 (3.4) | 1 (3.4) | 1 (3.4) | 1 (3.4) | 1 (3.4) | 29 (100.0) | | | 29 | 75.69 | 63.07 |
| 痛風腎 | 1 (1.9) | 3 (5.7) | 3 (5.7) | 12 (22.6) | 11 (20.8) | 4 (7.5) | 7 (13.2) | 1 (1.9) | 2 (3.8) | 1 (3.8) | 2 (3.8) | 2 (3.8) | 2 (3.8) | 2 (3.8) | 2 (3.8) | 2 (3.8) | 53 (100.0) | 3 | 56 | 134.45 | 134.96 |
| 先天性代謝異常による腎不全 | 1 (6.7) | 3 (20.0) | 1 (20.0) | 1 (6.7) | 1 (6.7) | 1 (6.7) | 1 (33.3) | | | | | | | | | 15 (100.0) | | 15 | 124.27 | 97.55 | |
| 腎・尿路結核 | 1 (20.0) | 1 (20.0) | 3 (60.0) | | | | | | | | | | | | | 5 (100.0) | | 5 | 72.60 | 49.33 | |
| 腎・尿路結石 | 3 (15.8) | 2 (10.5) | 1 (5.3) | 6 (31.6) | 1 (5.3) | 1 (10.5) | 2 (10.5) | | | | | | | | | 1 (100.0) | | 2 | 21 | 113.89 | 123.23 |
| 腎・尿路腫瘍 | 1 (2.4) | 8 (19.0) | 4 (9.5) | 4 (9.5) | 5 (11.9) | 3 (7.1) | 3 (9.5) | 4 (7.1) | 3 (2.4) | 2 (7.1) | 2 (4.8) | 2 (2.4) | 2 (4.8) | 1 (2.4) | 1 (2.4) | 2 (4.8) | 42 (100.0) | | 42 | 140.36 | 146.52 |
| 閉塞性尿路障害 | 5 (14.3) | 1 (2.9) | 4 (11.4) | 4 (11.4) | 3 (8.6) | 7 (20.0) | 3 (8.6) | 3 (8.6) | 2 (5.7) | 1 (2.9) | 35 (100.0) | 1 | 36 | 113.37 | 113.49 |
| 骨髄腫 | 3 (21.4) | 1 (7.1) | 1 (7.1) | 3 (21.4) | 1 (7.1) | 1 (7.1) | 2 (14.3) | 1 (7.1) | | | | | | | | 14 (100.0) | | 1 | 15 | 100.64 | 102.02 |
| 腎形成不全 | 3 (8.3) | 2 (5.6) | 1 (2.8) | 5 (13.9) | 6 (16.7) | 2 (5.6) | 7 (19.4) | 4 (11.1) | 1 (2.8) | 2 (5.6) | 1 (8.3) | 2 (8.3) | 3 (8.3) | 3 (8.3) | 3 (8.3) | 36 (100.0) | | 36 | 134.47 | 109.90 | |
| 不明 | 99 (7.9) | 137 (11.0) | 125 (10.0) | 197 (15.6) | 163 (13.0) | 132 (10.6) | 103 (8.2) | 1 (0.1) | 83 (6.6) | 58 (4.6) | 41 (3.3) | 36 (2.9) | 19 (1.5) | 11 (0.9) | 19 (1.5) | 26 (2.1) | 1,250 (100.0) | 40 | 1,290 | 118.94 | 142.77 |
| 再導入 | 12 (10.6) | 8 (7.1) | 16 (14.2) | 17 (15.0) | 10 (8.8) | 12 (10.6) | 4 (3.5) | 1 (0.9) | 13 (11.5) | 2 (1.8) | 7 (2.7) | 3 (6.2) | 1 (0.9) | 1 (0.9) | 2 (1.8) | 4 (3.5) | 113 (100.0) | 1 | 114 | 125.53 | 135.15 |
| その他 | 33 (8.8) | 43 (11.4) | 31 (8.2) | 65 (17.2) | 52 (13.8) | 34 (9.0) | 32 (8.5) | 30 (8.0) | 17 (4.5) | 10 (2.7) | 13 (3.4) | 12 (0.5) | 6 (1.6) | 4 (1.1) | 5 (1.1) | 377 (100.0) | 11 | 388 | 108.81 | 102.96 | |
| 合計 | 1,251 (8.0) | 1,656 (10.6) | 1,657 (10.6) | 2,506 (16.0) | 2,158 (13.8) | 1,746 (11.1) | 1,277 (8.1) | 47 (0.3) | 938 (6.0) | 692 (4.4) | 453 (2.9) | 525 (3.4) | 244 (1.6) | 143 (1.6) | 177 (1.6) | 199 (1.6) | 15,669 (100.0) | 383 | 16,052 | 110.88 | 116.86 |
| 記載なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 | 1,251 (8.0) | 1,656 (10.6) | 1,657 (10.6) | 2,506 (16.0) | 2,158 (13.8) | 1,746 (11.1) | 1,277 (8.1) | 47 (0.3) | 938 (6.0) | 692 (4.4) | 453 (2.9) | 525 (3.4) | 244 (1.6) | 143 (0.9) | 177 (1.1) | 199 (1.3) | 15,669 (100.0) | 383 | 16,052 | 110.88 | 116.86 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D4263##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査