

表 1208 PTH値(pg/mL) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回) PTH測定法:whole-PTH

性別	20未満	20 ～	35 ～	50 ～	75 ～	100 ～	125 ～	150 ～	151 ～	180 ～	210 ～	240 ～	300 ～	350 ～	400 ～	500 ～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	217	337	321	535	498	396	282	7	209	168	104	118	49	36	43	39	3,359	24	3,383	114.26	111.64
(%)	(6.5)	(10.0)	(9.6)	(15.9)	(14.8)	(11.8)	(8.4)	(0.2)	(6.2)	(5.0)	(3.1)	(3.5)	(1.5)	(1.1)	(1.3)	(1.2)	(100.0)				
女性	176	174	178	286	228	193	145	9	96	74	55	79	43	22	24	30	1,812	20	1,832	118.84	134.99
(%)	(9.7)	(9.6)	(9.8)	(15.8)	(12.6)	(10.7)	(8.0)	(0.5)	(5.3)	(4.1)	(3.0)	(4.4)	(2.4)	(1.2)	(1.3)	(1.7)	(100.0)				
合計	393	511	499	821	726	589	427	16	305	242	159	197	92	58	67	69	5,171	44	5,215	115.87	120.35
(%)	(7.6)	(9.9)	(9.6)	(15.9)	(14.0)	(11.4)	(8.3)	(0.3)	(5.9)	(4.7)	(3.1)	(3.8)	(1.8)	(1.1)	(1.3)	(1.3)	(100.0)				
記載なし																					
(%)																					
総計	393	511	499	821	726	589	427	16	305	242	159	197	92	58	67	69	5,171	44	5,215	115.87	120.35
(%)	(7.6)	(9.9)	(9.6)	(15.9)	(14.0)	(11.4)	(8.3)	(0.3)	(5.9)	(4.7)	(3.1)	(3.8)	(1.8)	(1.1)	(1.3)	(1.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
##D4270##  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査