

表 1213 PTH値(pg/mL) 性別 (腹膜透析患者) PTH測定法:whole-PTH

性別	20未満	20 ～	35 ～	50 ～	75 ～	100 ～	125 ～	150 ～	151 ～	180 ～	210 ～	240 ～	300 ～	350 ～	400 ～	500 ～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	23	34	41	52	46	45	42		28	26	16	17	16	4	4	5	399	28	427	126.47	107.20
(%)	(5.8)	(8.5)	(10.3)	(13.0)	(11.5)	(11.3)	(10.5)		(7.0)	(6.5)	(4.0)	(4.3)	(4.0)	(1.0)	(1.0)	(1.3)	(100.0)				
女性	16	14	17	40	24	26	13		11	9	7	13	1	5	5	5	206	10	216	132.59	142.21
(%)	(7.8)	(6.8)	(8.3)	(19.4)	(11.7)	(12.6)	(6.3)		(5.3)	(4.4)	(3.4)	(6.3)	(0.5)	(2.4)	(2.4)	(2.4)	(100.0)				
合計	39	48	58	92	70	71	55		39	35	23	30	17	9	9	10	605	38	643	128.55	120.18
(%)	(6.4)	(7.9)	(9.6)	(15.2)	(11.6)	(11.7)	(9.1)		(6.4)	(5.8)	(3.8)	(5.0)	(2.8)	(1.5)	(1.5)	(1.7)	(100.0)				
記載なし																					
(%)																					
総計	39	48	58	92	70	71	55		39	35	23	30	17	9	9	10	605	38	643	128.55	120.18
(%)	(6.4)	(7.9)	(9.6)	(15.2)	(11.6)	(11.7)	(9.1)		(6.4)	(5.8)	(3.8)	(5.0)	(2.8)	(1.5)	(1.5)	(1.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D4280##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査