

表 1214 PTH値(pg/mL) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者) PTH測定法:whole-PTH

| 年齢 | 20未満 | 20 ~ | 35 ~ | 50 ~ | 75 ~ | 100 ~ | 125 ~ | 150 ~ | 151 ~ | 180 ~ | 210 ~ | 240 ~ | 300 ~ | 350 ~ | 400 ~ | 500 ~ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 15歳未満 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15歳~ (%) | | 1 (25.0) | 1 (25.0) | 1 (25.0) | | | | | 1 (25.0) | | | | | | | | 4 (100.0) | 1 (100.0) | 5 (41) | 80.25 | 62.81 | |
| 30歳~ (%) | 3 (7.9) | 4 (10.5) | 2 (5.3) | 2 (5.3) | 6 (15.8) | 5 (13.2) | 3 (7.9) | | 3 (7.9) | 4 (10.5) | 2 (5.3) | | | | | 2 (5.3) | 2 (5.3) | 38 (100.0) | 3 (100.0) | 158.08 | 163.26 | |
| 45歳~ (%) | 9 (5.3) | 9 (5.3) | 18 (10.5) | 22 (12.9) | 16 (9.4) | 24 (14.0) | 14 (8.2) | | 12 (7.0) | 13 (7.6) | 7 (4.1) | 13 (7.6) | 5 (2.9) | 3 (1.8) | 4 (2.3) | 2 (1.2) | 171 (100.0) | 12 (100.0) | 183 (100.0) | 137.09 | 105.85 | |
| 60歳~ (%) | 21 (7.4) | 21 (7.4) | 28 (9.9) | 49 (17.3) | 36 (12.7) | 32 (11.3) | 25 (8.8) | | 15 (5.3) | 13 (4.6) | 13 (4.6) | 8 (2.8) | 11 (3.9) | 4 (1.4) | 3 (1.1) | 4 (1.4) | 3 (1.4) | 283 (100.0) | 15 (100.0) | 298 (100.0) | 122.19 | 121.56 |
| 75歳~ (%) | 5 (4.9) | 11 (10.8) | 8 (7.8) | 18 (17.6) | 12 (11.8) | 10 (9.8) | 13 (12.7) | | 6 (5.9) | 5 (4.9) | 3 (2.9) | 6 (5.9) | 1 (1.0) | 2 (2.0) | 2 (2.0) | 1 (2.0) | 2 (2.0) | 102 (100.0) | 7 (100.0) | 109 (100.0) | 124.61 | 122.97 |
| 90歳~ (%) | 1 (14.3) | 2 (28.6) | 1 (14.3) | | | | | | 2 (28.6) | | | 1 (14.3) | | | | | 7 (100.0) | | 7 (100.0) | 102.14 | 94.92 | |
| 合計 | 39 (6.4) | 48 (7.9) | 58 (9.6) | 92 (15.2) | 70 (11.6) | 71 (11.7) | 55 (9.1) | | 39 (6.4) | 35 (5.8) | 23 (3.8) | 30 (5.0) | 17 (2.8) | 9 (1.5) | 9 (1.5) | 10 (1.5) | 605 (100.0) | 38 (100.0) | 643 (100.0) | 128.55 | 120.18 | |
| 不明 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 | 39 (6.4) | 48 (7.9) | 58 (9.6) | 92 (15.2) | 70 (11.6) | 71 (11.7) | 55 (9.1) | | 39 (6.4) | 35 (5.8) | 23 (3.8) | 30 (5.0) | 17 (2.8) | 9 (1.5) | 9 (1.5) | 10 (1.5) | 605 (100.0) | 38 (100.0) | 643 (100.0) | 128.55 | 120.18 | |
| 平均 | 64.90 | 65.42 | 62.66 | 65.34 | 63.51 | 61.31 | 65.16 | | 62.54 | 59.40 | 64.52 | 61.40 | 63.88 | 63.33 | 52.44 | 63.00 | 63.31 | 61.03 | 63.17 | | | |
| 標準偏差 | 12.55 | 15.09 | 11.78 | 11.81 | 12.45 | 12.07 | 11.48 | | 15.21 | 12.20 | 8.80 | 13.84 | 7.19 | 14.54 | 14.77 | 15.59 | 12.60 | 14.88 | 12.74 | | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4281##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査