

表 1218 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 治療方法別(透析患者全体)

治療方法	5未満	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析	266 (%)	389 (0.1)	889 (0.2)	3,260 (0.4)	10,919 (1.5)	33,274 (5.2)	68,774 (15.8)	60,195 (32.7)	23,764 (28.6)	6,285 (11.3)	2,441 (3.0)	210,456 (1.2)	23,248 (100.0)	233,704 (100.0)	10.76	1.32
血液透析濾過	32 (%)	40 (0.0)	158 (0.1)	649 (0.2)	2,518 (1.0)	9,530 (3.7)	22,898 (14.0)	20,877 (33.6)	8,239 (30.6)	2,312 (12.1)	961 (3.4)	68,214 (1.4)	6,585 (100.0)	74,799 (100.0)	10.91	1.24
血液濾過							8 (42.1)	3 (15.8)	3 (15.8)	4 (21.1)	1 (5.3)		19 (100.0)	19 (100.0)	10.69	1.32
血液吸着透析	1 (%)		3 (0.1)	14 (0.2)	65 (1.1)	230 (5.1)	449 (18.1)	348 (35.4)	120 (27.4)	31 (9.4)	9 (2.4)	1,270 (0.7)	85 (100.0)	1,355 (100.0)	10.69	1.21
在宅血液透析		1 (%)	2 (0.2)	2 (0.4)	17 (0.4)	58 (3.4)	98 (11.7)	151 (19.8)	100 (30.4)	41 (20.2)	26 (8.3)	496 (5.2)	121 (100.0)	617 (100.0)	11.43	1.53
腹膜透析	3 (%)	7 (0.1)	15 (0.3)	95 (1.6)	283 (4.9)	844 (14.6)	1,598 (27.6)	1,793 (31.0)	809 (14.0)	253 (4.4)	89 (1.5)	5,789 (100.0)	2,826 (100.0)	8,615 (100.0)	10.92	1.36
合計	302 (%)	437 (0.1)	1,067 (0.2)	4,020 (0.4)	13,802 (1.4)	43,944 (4.8)	93,820 (15.4)	83,367 (32.8)	33,036 (29.1)	8,923 (11.5)	3,526 (3.1)	286,244 (1.2)	32,865 (100.0)	319,109 (100.0)	10.80	1.30
記載なし																
総計	302 (%)	437 (0.1)	1,067 (0.2)	4,020 (0.4)	13,802 (1.4)	43,944 (4.8)	93,820 (15.4)	83,367 (32.8)	33,036 (29.1)	8,923 (11.5)	3,526 (3.1)	286,244 (1.2)	32,865 (100.0)	319,109 (100.0)	10.80	1.30

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D4310##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査