

表 1220 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 併用の状況別 (透析患者全体)

併用の状況	5未満	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	
HD(F)単独	299 (%)	429 (0.1)	1,052 (0.2)	3,918 (0.4)	13,508 (1.4)	43,060 (4.8)	92,141 (15.4)	81,514 (32.9)	32,190 (29.1)	8,659 (11.5)	3,431 (3.1)	280,201 (1.2)	29,937 (100.0)	310,138 (100.0)	10.80	1.30	
PD単独	3 (%)	7 (0.1)	12 (0.2)	77 (0.3)	230 (1.7)	669 (5.1)	1,258 (14.9)	1,365 (28.0)	625 (30.4)	187 (13.9)	56 (4.2)	4,489 (1.2)	2,442 (100.0)	6,931 (100.0)	10.88	1.35	
HD(F)単独.PDカテあり				4 (2.6)	2 (1.3)	23 (15.1)	61 (40.1)	30 (19.7)	22 (14.5)	6 (3.9)	4 (2.6)	152 (100.0)	25 (100.0)	177 (100.0)	10.90	1.34	
PD.HD併用週1HD(F)				2 (0.2)	15 (1.3)	47 (4.0)	161 (13.8)	299 (25.7)	386 (33.2)	166 (14.3)	59 (5.1)	29 (2.5)	1,164 (100.0)	332 (100.0)	1,496 (100.0)	11.06	1.36
PD.HD併用週2HD(F)				1 (0.7)	2 (1.4)	8 (5.7)	12 (8.5)	32 (22.7)	47 (33.3)	24 (17.0)	10 (7.1)	5 (3.5)	141 (100.0)	24 (100.0)	165 (100.0)	11.25	1.55
PD.HD併用週3HD(F)				2 (6.1)	5 (15.2)	7 (21.2)	8 (24.2)	6 (18.2)	5 (15.2)			33 (100.0)	4 (100.0)	37 (100.0)	10.18	1.39	
PD.HD併用週4HD(F)					1 (100.0)							1 (100.0)		1 (100.0)	9.40		
PD.HD併用その他				2 (4.3)	2 (4.3)	10 (21.7)	15 (32.6)	11 (23.9)	3 (6.5)	2 (4.3)	1 (2.2)	46 (100.0)	17 (100.0)	63 (100.0)	10.63	1.43	
合計	302 (%)	436 (0.1)	1,067 (0.2)	4,020 (0.4)	13,802 (1.4)	43,943 (4.8)	93,814 (15.4)	83,359 (32.8)	33,035 (29.1)	8,923 (11.5)	3,526 (3.1)	286,227 (1.2)	32,781 (100.0)	319,008 (100.0)	10.80	1.30	
不明		1 (5.9)				1 (5.9)	6 (35.3)	8 (47.1)	1 (5.9)			17 (100.0)	5 (100.0)	22 (100.0)	10.62	1.41	
記載なし													79 (100.0)	79 (100.0)			
総計	302 (%)	437 (0.1)	1,067 (0.2)	4,020 (0.4)	13,802 (1.4)	43,944 (4.8)	93,820 (15.4)	83,367 (32.8)	33,036 (29.1)	8,923 (11.5)	3,526 (3.1)	286,244 (1.2)	32,865 (100.0)	319,109 (100.0)	10.80	1.30	

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D4312##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査