

表 1221 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 性別 (透析患者全体)

性別	5未満	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	176 (%)	283 (0.2)	684 (0.4)	2,424 (1.3)	8,238 (4.5)	26,674 (14.4)	59,306 (32.1)	55,033 (29.8)	22,711 (12.3)	6,463 (3.5)	2,761 (1.5)	184,753 (100.0)	21,170	205,923	10.86	1.32
女性	126 (%)	154 (0.2)	383 (0.4)	1,596 (1.6)	5,564 (5.5)	17,270 (17.0)	34,514 (34.0)	28,334 (27.9)	10,325 (10.2)	2,460 (2.4)	765 (0.8)	101,491 (100.0)	11,694	113,185	10.68	1.26
合計	302 (%)	437 (0.2)	1,067 (0.4)	4,020 (1.4)	13,802 (4.8)	43,944 (15.4)	93,820 (32.8)	83,367 (29.1)	33,036 (11.5)	8,923 (3.1)	3,526 (1.2)	286,244 (100.0)	32,864	319,108	10.80	1.30
記載なし (%)													1	1		
総計	302 (%)	437 (0.2)	1,067 (0.4)	4,020 (1.4)	13,802 (4.8)	43,944 (15.4)	93,820 (32.8)	83,367 (29.1)	33,036 (11.5)	8,923 (3.1)	3,526 (1.2)	286,244 (100.0)	32,865	319,109	10.80	1.30

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D4313##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査