

表 1222 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)				1 (1.5)	6 (9.0)	9 (13.4)	10 (14.9)	24 (35.8)	8 (11.9)	6 (9.0)	3 (4.5)	67 (100.0)	26	93	11.09	1.67
15歳～ (%)	5 (0.6)		2 (0.3)	9 (1.1)	29 (3.7)	107 (13.5)	234 (29.5)	248 (31.3)	115 (14.5)	32 (4.0)	12 (1.5)	793 (100.0)	118	911	10.93	1.41
30歳～ (%)	8 (0.1)	16 (0.1)	31 (0.3)	134 (1.1)	424 (3.5)	1,510 (12.6)	3,665 (30.5)	3,686 (30.7)	1,714 (14.3)	570 (4.7)	259 (2.2)	12,017 (100.0)	1,405	13,422	11.03	1.34
45歳～ (%)	53 (0.1)	76 (0.1)	147 (0.3)	507 (1.0)	1,851 (3.6)	6,447 (12.5)	15,580 (30.3)	16,098 (31.3)	7,350 (14.3)	2,289 (4.4)	1,047 (2.0)	51,445 (100.0)	5,899	57,344	11.02	1.34
60歳～ (%)	134 (0.1)	178 (0.1)	445 (0.3)	1,640 (1.3)	5,712 (4.5)	19,043 (15.0)	42,140 (33.1)	37,779 (29.7)	14,780 (11.6)	3,863 (3.0)	1,545 (1.2)	127,259 (100.0)	14,370	141,629	10.82	1.28
75歳～ (%)	97 (0.1)	154 (0.2)	418 (0.5)	1,590 (1.8)	5,366 (6.0)	15,717 (17.6)	30,347 (34.0)	24,248 (27.2)	8,611 (9.6)	2,047 (2.3)	644 (0.7)	89,239 (100.0)	10,374	99,613	10.63	1.28
90歳～ (%)	5 (0.1)	13 (0.2)	24 (0.4)	139 (2.6)	414 (7.6)	1,111 (20.5)	1,844 (34.0)	1,284 (23.7)	458 (8.4)	116 (2.1)	16 (0.3)	5,424 (100.0)	671	6,095	10.47	1.29
合計 (%)	302 (0.1)	437 (0.2)	1,067 (0.4)	4,020 (1.4)	13,802 (4.8)	43,944 (15.4)	93,820 (32.8)	83,367 (29.1)	33,036 (11.5)	8,923 (3.1)	3,526 (1.2)	286,244 (100.0)	32,863	319,107	10.80	1.30
不明 (%)																
記載なし (%)													2	2		
総計 (%)	302 (0.1)	437 (0.2)	1,067 (0.4)	4,020 (1.4)	13,802 (4.8)	43,944 (15.4)	93,820 (32.8)	83,367 (29.1)	33,036 (11.5)	8,923 (3.1)	3,526 (1.2)	286,244 (100.0)	32,865	319,109	10.80	1.30
平均	68.37	69.36	70.52	70.95	70.72	69.77	68.64	67.45	66.23	64.84	62.88	68.14	68.19	68.15		
標準偏差	13.26	12.39	12.26	12.35	12.28	12.22	12.25	12.43	12.61	12.90	12.53	12.46	12.72	12.48		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D4314##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査