

表 1224 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 原疾患別 (透析患者全体)

原疾患	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	108 (0.1)	117 (0.1)	247 (0.3)	1,016 (1.2)	3,646 (4.4)	12,195 (14.8)	27,002 (32.8)	24,858 (30.2)	9,683 (11.8)	2,521 (3.1)	1,003 (1.2)	82,396 (100.0)	9,387	91,783	10.83	1.28
慢性腎盂腎炎 (%)	4 (0.2)	3 (0.1)	13 (0.5)	42 (1.6)	144 (5.5)	399 (15.2)	896 (34.1)	722 (27.5)	299 (11.4)	73 (2.8)	34 (1.3)	2,629 (100.0)	267	2,896	10.75	1.34
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (0.0)	4 (0.2)	5 (0.2)	30 (1.3)	121 (5.3)	378 (16.7)	774 (34.2)	594 (26.3)	259 (11.5)	74 (3.3)	22 (1.0)	2,262 (100.0)	276	2,538	10.75	1.27
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1 (0.1)	3 (0.2)	2 (0.1)	24 (1.8)	62 (4.5)	237 (17.3)	448 (32.7)	409 (29.9)	147 (10.7)	24 (1.8)	13 (0.9)	1,370 (100.0)	113	1,483	10.71	1.23
その他の分類不能の腎炎 (%)	1 (0.1)	5 (0.4)	7 (0.5)	9 (0.7)	54 (4.1)	185 (14.0)	440 (33.3)	407 (30.8)	155 (11.7)	40 (3.0)	18 (1.4)	1,321 (100.0)	133	1,454	10.86	1.28
多発性嚢胞腎 (%)	14 (0.1)	10 (0.1)	25 (0.2)	110 (1.1)	364 (3.5)	1,341 (12.9)	3,328 (31.9)	3,145 (30.2)	1,394 (13.4)	423 (4.1)	264 (2.5)	10,418 (100.0)	1,053	11,471	11.00	1.36
腎硬化症 (%)	38 (0.1)	39 (0.1)	115 (0.4)	435 (1.5)	1,433 (5.0)	4,517 (15.8)	9,609 (33.7)	8,233 (28.9)	3,071 (10.8)	749 (2.6)	261 (0.9)	28,500 (100.0)	3,150	31,650	10.74	1.28
悪性高血圧 (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	6 (0.3)	26 (1.1)	110 (4.6)	357 (14.9)	783 (32.6)	689 (28.7)	317 (13.2)	81 (3.4)	27 (1.1)	2,399 (100.0)	322	2,721	10.86	1.28
糖尿病性腎症 (%)	85 (0.1)	177 (0.2)	450 (0.4)	1,536 (1.4)	5,502 (5.0)	17,570 (15.8)	36,261 (32.6)	31,760 (28.6)	12,746 (11.5)	3,549 (3.2)	1,428 (1.3)	111,064 (100.0)	12,593	123,657	10.79	1.31
SLE腎炎 (%)	1 (0.1)	5 (0.3)	10 (0.5)	35 (1.8)	121 (6.1)	292 (14.8)	656 (33.1)	549 (27.7)	222 (11.2)	65 (3.3)	23 (1.2)	1,979 (100.0)	243	2,222	10.74	1.34
アミロイド腎 (%)	1 (0.3)		3 (0.8)	10 (2.6)	18 (4.6)	63 (16.2)	126 (32.3)	97 (24.9)	59 (15.1)	10 (2.6)	3 (0.8)	390 (100.0)	48	438	10.72	1.40
痛風腎 (%)		2 (0.2)	5 (0.5)	7 (0.7)	42 (4.4)	120 (12.6)	315 (33.0)	304 (31.9)	120 (12.6)	26 (2.7)	13 (1.4)	954 (100.0)	102	1,056	10.89	1.25
先天性代謝異常による腎不全 (%)			1 (0.4)	5 (2.0)	13 (5.2)	37 (14.7)	71 (28.2)	82 (32.5)	28 (11.1)	9 (3.6)	6 (2.4)	252 (100.0)	29	281	10.88	1.38
腎・尿路結核 (%)		1 (0.7)	2 (1.3)		11 (7.4)	26 (17.4)	51 (34.2)	41 (27.5)	14 (9.4)	2 (1.3)	1 (0.7)	149 (100.0)	19	168	10.58	1.30
腎・尿路結石 (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	5 (1.0)	10 (1.9)	25 (4.8)	78 (15.1)	154 (29.8)	146 (28.2)	62 (12.0)	29 (5.6)	6 (1.2)	517 (100.0)	61	578	10.82	1.47
腎・尿路腫瘍 (%)		4 (0.5)	7 (0.8)	15 (1.8)	46 (5.4)	150 (17.6)	290 (34.0)	233 (27.3)	82 (9.6)	19 (2.2)	8 (0.9)	854 (100.0)	105	959	10.63	1.31
閉塞性尿路障害 (%)		1 (0.2)	3 (0.5)	11 (1.7)	23 (3.5)	92 (14.0)	227 (34.4)	198 (30.0)	77 (11.7)	23 (3.5)	4 (0.6)	659 (100.0)	84	743	10.83	1.24
骨髄腫 (%)	2 (0.7)	1 (0.4)	8 (2.8)	26 (9.1)	38 (13.3)	61 (21.4)	60 (21.1)	57 (20.0)	24 (8.4)	8 (2.8)		285 (100.0)	38	323	9.96	1.69
腎形成不全 (%)	2 (0.3)	1 (0.2)	1 (0.2)	3 (0.5)	21 (3.5)	72 (12.1)	190 (31.9)	174 (29.2)	90 (15.1)	27 (4.5)	15 (2.5)	596 (100.0)	68	664	11.03	1.34
不明 (%)	27 (0.1)	50 (0.2)	113 (0.4)	507 (1.8)	1,543 (5.5)	4,307 (15.5)	9,105 (32.7)	8,006 (28.8)	3,063 (11.0)	843 (3.0)	260 (0.9)	27,824 (100.0)	3,588	31,412	10.74	1.31
再導入 (%)	1 (0.1)	2 (0.1)	6 (0.3)	22 (1.1)	78 (4.1)	283 (14.8)	613 (32.0)	578 (30.1)	240 (12.5)	70 (3.6)	25 (1.3)	1,918 (100.0)	256	2,174	10.89	1.30
その他 (%)	14 (0.2)	9 (0.1)	33 (0.4)	141 (1.9)	387 (5.2)	1,184 (15.8)	2,421 (32.2)	2,085 (27.8)	884 (11.8)	258 (3.4)	92 (1.2)	7,508 (100.0)	930	8,438	10.77	1.36
合計 (%)	302 (0.1)	437 (0.2)	1,067 (0.4)	4,020 (1.4)	13,802 (4.8)	43,944 (15.4)	93,820 (32.8)	83,367 (29.1)	33,036 (11.5)	8,923 (3.1)	3,526 (1.2)	286,244 (100.0)	32,865	319,109	10.80	1.30
記載なし (%)																
総計 (%)	302 (0.1)	437 (0.2)	1,067 (0.4)	4,020 (1.4)	13,802 (4.8)	43,944 (15.4)	93,820 (32.8)	83,367 (29.1)	33,036 (11.5)	8,923 (3.1)	3,526 (1.2)	286,244 (100.0)	32,865	319,109	10.80	1.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

##D4316##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査