

表 1226 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	5未満	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	151 (%)	245 (0.2)	522 (0.4)	1,817 (1.4)	6,129 (4.7)	19,358 (14.8)	41,884 (32.1)	38,386 (29.4)	15,711 (12.1)	4,346 (3.3)	1,809 (1.4)	130,358 (100.0)	5,092	135,450	10.83	1.33
女性	107 (%)	129 (0.2)	296 (0.4)	1,169 (1.6)	4,167 (5.8)	12,359 (17.3)	24,147 (33.9)	19,571 (27.4)	7,152 (10.0)	1,693 (2.4)	532 (0.7)	71,322 (100.0)	2,763	74,085	10.65	1.28
合計	258 (%)	374 (0.2)	818 (0.4)	2,986 (1.5)	10,296 (5.1)	31,717 (15.7)	66,031 (32.7)	57,957 (28.7)	22,863 (11.3)	6,039 (3.0)	2,341 (1.2)	201,680 (100.0)	7,855	209,535	10.77	1.31
記載なし (%)													1	1		
総計	258 (%)	374 (0.2)	818 (0.4)	2,986 (1.5)	10,296 (5.1)	31,717 (15.7)	66,031 (32.7)	57,957 (28.7)	22,863 (11.3)	6,039 (3.0)	2,341 (1.2)	201,680 (100.0)	7,856	209,536	10.77	1.31

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D4320##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査