

表 1227 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	5未満	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)				1 (20.0)		3 (60.0)	1 (20.0)					5 (100.0)		5	10.04	1.54
15歳~ (%)	4 (0.9)		2 (0.4)	8 (1.7)	17 (3.6)	68 (14.5)	147 (31.3)	144 (30.6)	57 (12.1)	16 (3.4)	7 (1.5)	470 (100.0)	26	496	10.80	1.46
30歳~ (%)	7 (0.1)	14 (0.2)	27 (0.4)	90 (1.2)	281 (3.7)	988 (13.1)	2,299 (30.6)	2,257 (30.0)	1,072 (14.3)	342 (4.5)	142 (1.9)	7,519 (100.0)	295	7,814	10.98	1.34
45歳~ (%)	43 (0.1)	64 (0.2)	103 (0.3)	356 (1.1)	1,283 (3.9)	4,202 (12.7)	9,980 (30.1)	10,384 (31.3)	4,714 (14.2)	1,413 (4.3)	636 (1.9)	33,178 (100.0)	1,314	34,492	10.99	1.35
60歳~ (%)	114 (0.1)	150 (0.2)	338 (0.4)	1,200 (1.3)	4,193 (4.7)	13,544 (15.2)	29,322 (33.0)	26,141 (29.4)	10,280 (11.6)	2,624 (2.9)	1,063 (1.2)	88,969 (100.0)	3,413	92,382	10.80	1.30
75歳~ (%)	86 (0.1)	136 (0.2)	329 (0.5)	1,225 (1.8)	4,193 (6.2)	12,063 (17.9)	22,870 (33.9)	18,054 (26.8)	6,387 (9.5)	1,554 (2.3)	482 (0.7)	67,379 (100.0)	2,645	70,024	10.61	1.29
90歳~ (%)	4 (0.1)	10 (0.2)	19 (0.5)	106 (2.5)	329 (7.9)	852 (20.5)	1,410 (33.9)	976 (23.5)	353 (8.5)	90 (2.2)	11 (0.3)	4,160 (100.0)	161	4,321	10.46	1.29
合計	258 (0.1)	374 (0.2)	818 (0.4)	2,986 (1.5)	10,296 (5.1)	31,717 (15.7)	66,031 (32.7)	57,957 (28.7)	22,863 (11.3)	6,039 (3.0)	2,341 (1.2)	201,680 (100.0)	7,854	209,534	10.77	1.31
不明 (%)																
記載なし (%)													2	2		
総計	258 (0.1)	374 (0.2)	818 (0.4)	2,986 (1.5)	10,296 (5.1)	31,717 (15.7)	66,031 (32.7)	57,957 (28.7)	22,863 (11.3)	6,039 (3.0)	2,341 (1.2)	201,680 (100.0)	7,856	209,536	10.77	1.31
平均	68.74	69.49	70.66	71.39	71.33	70.48	69.41	68.21	67.02	65.88	63.99	68.93	68.93	68.93		
標準偏差	13.21	12.45	12.29	12.18	12.00	12.02	12.08	12.23	12.42	12.76	12.30	12.26	12.38	12.26		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D4321##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査