

表 1229 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	95 (0.2)	101 (0.2)	173 (0.3)	729 (1.3)	2,622 (4.8)	8,422 (15.3)	18,041 (32.8)	16,311 (29.7)	6,286 (11.4)	1,583 (2.9)	647 (1.2)	55,010 (100.0)	2,162	57,172	10.79	1.30
慢性腎盂腎炎 (%)	4 (0.2)	2 (0.1)	10 (0.6)	32 (1.8)	108 (6.0)	271 (15.0)	623 (34.4)	494 (27.3)	198 (10.9)	49 (2.7)	21 (1.2)	1,812 (100.0)	56	1,868	10.71	1.35
急速進行性糸球体腎炎 (%)		4 (0.2)	3 (0.2)	23 (1.4)	84 (5.2)	270 (16.7)	559 (34.5)	423 (26.1)	188 (11.6)	49 (3.0)	15 (0.9)	1,618 (100.0)	69	1,687	10.75	1.26
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1 (0.1)	3 (0.4)	2 (0.2)	18 (2.2)	38 (4.6)	121 (14.6)	288 (34.8)	250 (30.2)	83 (10.0)	15 (1.8)	8 (1.0)	827 (100.0)	22	849	10.70	1.26
その他の分類不能の腎炎 (%)	1 (0.1)	5 (0.6)	6 (0.7)	6 (0.7)	34 (3.9)	128 (14.7)	292 (33.6)	260 (29.9)	103 (11.8)	23 (2.6)	12 (1.4)	870 (100.0)	32	902	10.81	1.32
多発性嚢胞腎 (%)	12 (0.2)	10 (0.1)	19 (0.3)	83 (1.1)	269 (3.7)	956 (13.1)	2,303 (31.5)	2,177 (29.8)	992 (13.6)	302 (4.1)	177 (2.4)	7,300 (100.0)	248	7,548	10.98	1.37
腎硬化症 (%)	32 (0.2)	38 (0.2)	92 (0.4)	321 (1.5)	1,094 (5.3)	3,397 (16.3)	6,998 (33.7)	5,949 (28.6)	2,163 (10.4)	531 (2.6)	176 (0.8)	20,791 (100.0)	727	21,518	10.71	1.29
悪性高血圧 (%)	1 (0.1)	2 (0.1)	5 (0.3)	22 (1.3)	74 (4.4)	259 (15.3)	561 (33.2)	482 (28.5)	202 (12.0)	60 (3.6)	21 (1.2)	1,689 (100.0)	88	1,777	10.83	1.31
糖尿病性腎症 (%)	69 (0.1)	151 (0.2)	358 (0.4)	1,181 (1.5)	4,233 (5.2)	13,068 (16.1)	26,437 (32.5)	23,132 (28.4)	9,200 (11.3)	2,540 (3.1)	972 (1.2)	81,341 (100.0)	3,127	84,468	10.77	1.32
SLE腎炎 (%)	1 (0.1)	3 (0.2)	6 (0.5)	23 (1.8)	84 (6.4)	218 (16.6)	419 (32.0)	360 (27.5)	147 (11.2)	38 (2.9)	12 (0.9)	1,311 (100.0)	59	1,370	10.69	1.33
アミロイド腎 (%)	1 (0.4)		3 (1.1)	7 (2.6)	13 (4.8)	52 (19.3)	87 (32.3)	62 (23.0)	35 (13.0)	7 (2.6)	2 (0.7)	269 (100.0)	11	280	10.61	1.44
痛風腎 (%)		2 (0.3)	2 (0.3)	5 (0.7)	32 (4.7)	85 (12.6)	228 (33.8)	207 (30.7)	88 (13.0)	17 (2.5)	9 (1.3)	675 (100.0)	25	700	10.88	1.25
先天性代謝異常による腎不全 (%)			1 (0.6)	3 (1.9)	9 (5.6)	26 (16.3)	42 (26.3)	50 (31.3)	17 (10.6)	6 (3.8)	6 (3.8)	160 (100.0)	9	169	10.89	1.53
腎・尿路結核 (%)		1 (1.0)	2 (2.0)		6 (6.1)	19 (19.2)	34 (34.3)	26 (26.3)	8 (8.1)	2 (2.0)	1 (1.0)	99 (100.0)	7	106	10.55	1.40
腎・尿路結石 (%)	1 (0.3)	1 (0.3)	2 (0.5)	7 (1.9)	23 (6.3)	59 (16.0)	102 (27.7)	97 (26.4)	51 (13.9)	21 (5.7)	4 (1.1)	368 (100.0)	16	384	10.81	1.51
腎・尿路腫瘍 (%)		2 (0.3)	7 (1.1)	13 (2.1)	34 (5.5)	116 (18.6)	216 (34.7)	172 (27.7)	49 (7.9)	7 (1.1)	6 (1.0)	622 (100.0)	22	644	10.53	1.27
閉塞性尿路障害 (%)		1 (0.2)	3 (0.7)	10 (2.3)	15 (3.4)	67 (15.1)	150 (33.9)	127 (28.7)	52 (11.7)	15 (3.4)	3 (0.7)	443 (100.0)	22	465	10.77	1.29
骨髄腫 (%)	2 (1.0)		7 (3.5)	19 (9.5)	28 (13.9)	48 (23.9)	42 (20.9)	32 (15.9)	17 (8.5)	6 (3.0)		201 (100.0)	12	213	9.86	1.71
腎形成不全 (%)	1 (0.3)		1 (0.3)	1 (0.3)	15 (4.2)	42 (11.7)	121 (33.7)	107 (29.8)	51 (14.2)	14 (3.9)	6 (1.7)	359 (100.0)	9	368	10.97	1.28
不明 (%)	23 (0.1)	40 (0.2)	85 (0.4)	367 (1.9)	1,167 (6.0)	3,083 (15.7)	6,435 (32.8)	5,478 (28.0)	2,180 (11.1)	559 (2.9)	174 (0.9)	19,591 (100.0)	887	20,478	10.71	1.32
再導入 (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	5 (0.4)	11 (1.0)	43 (3.8)	175 (15.6)	360 (32.2)	339 (30.3)	136 (12.2)	34 (3.0)	13 (1.2)	1,119 (100.0)	45	1,164	10.84	1.30
その他 (%)	13 (0.2)	6 (0.1)	26 (0.5)	105 (2.0)	271 (5.2)	835 (16.0)	1,693 (32.5)	1,422 (27.3)	617 (11.9)	161 (3.1)	56 (1.1)	5,205 (100.0)	201	5,406	10.74	1.36
合計 (%)	258 (0.1)	374 (0.2)	818 (0.4)	2,986 (1.5)	10,296 (5.1)	31,717 (15.7)	66,031 (32.7)	57,957 (28.7)	22,863 (11.3)	6,039 (3.0)	2,341 (1.2)	201,680 (100.0)	7,856	209,536	10.77	1.31
記載なし (%)																
総計 (%)	258 (0.1)	374 (0.2)	818 (0.4)	2,986 (1.5)	10,296 (5.1)	31,717 (15.7)	66,031 (32.7)	57,957 (28.7)	22,863 (11.3)	6,039 (3.0)	2,341 (1.2)	201,680 (100.0)	7,856	209,536	10.77	1.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4323##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査