

表 1232 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	5未満	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)																
15歳~ (%)	1 (0.4)	1 (0.0)	1 (0.0)	26 (0.7)	8 (3.5)	26 (11.5)	65 (28.8)	71 (31.4)	40 (17.7)	11 (4.9)	4 (1.8)	226 (100.0)	8 (100.0)	234 (100.0)	11.15 (100.0)	1.31 (100.0)
30歳~ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	26 (0.7)	95 (2.7)	398 (11.1)	1,120 (31.3)	1,173 (32.8)	507 (14.2)	174 (4.9)	83 (2.3)	3,579 (100.0)	110 (100.0)	3,689 (100.0)	11.13 (100.0)	1.27 (100.0)
45歳~ (%)	4 (0.0)	6 (0.0)	24 (0.2)	90 (0.6)	399 (2.7)	1,698 (11.6)	4,575 (31.3)	4,682 (32.0)	2,113 (14.5)	713 (4.9)	318 (2.2)	14,622 (100.0)	412 (100.0)	15,034 (100.0)	11.10 (100.0)	1.27 (100.0)
60歳~ (%)	13 (0.0)	19 (0.1)	67 (0.2)	278 (0.9)	1,072 (3.5)	4,247 (14.0)	10,405 (34.2)	9,371 (30.8)	3,581 (11.8)	979 (3.2)	404 (1.3)	30,436 (100.0)	893 (100.0)	31,329 (100.0)	10.89 (100.0)	1.22 (100.0)
75歳~ (%)	10 (0.1)	11 (0.1)	54 (0.3)	199 (1.2)	797 (4.8)	2,710 (16.3)	5,842 (35.0)	4,851 (29.1)	1,711 (10.3)	361 (2.2)	127 (0.8)	16,673 (100.0)	556 (100.0)	17,229 (100.0)	10.73 (100.0)	1.20 (100.0)
90歳~ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.2)	16 (1.9)	56 (6.7)	162 (19.5)	299 (35.9)	217 (26.1)	63 (7.6)	13 (1.6)	2 (0.2)	832 (100.0)	27 (100.0)	859 (100.0)	10.52 (100.0)	1.18 (100.0)
合計	30 (0.0)	38 (0.1)	148 (0.2)	609 (0.9)	2,427 (3.7)	9,241 (13.9)	22,306 (33.6)	20,365 (30.7)	8,015 (12.1)	2,251 (3.4)	938 (1.4)	66,368 (100.0)	2,006 (100.0)	68,374 (100.0)	10.91 (100.0)	1.24 (100.0)
不明 (%)																
記載なし (%)																
総計	30 (0.0)	38 (0.1)	148 (0.2)	609 (0.9)	2,427 (3.7)	9,241 (13.9)	22,306 (33.6)	20,365 (30.7)	8,015 (12.1)	2,251 (3.4)	938 (1.4)	66,368 (100.0)	2,006 (100.0)	68,374 (100.0)	10.91 (100.0)	1.24 (100.0)
平均	68.43	69.08	70.48	69.07	68.86	67.78	66.56	65.55	64.29	62.43	61.13	66.05	66.73	66.07		
標準偏差	14.87	11.05	11.56	12.26	12.35	12.20	12.33	12.48	12.58	12.30	12.05	12.47	12.60	12.47		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D4331##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査