

表 1235 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 医療機関別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

医療機関	5未満	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	
国公立大学 (%)			1 (2.0)	2 (3.9)	12 (23.5)	4 (7.8)	17 (33.3)	10 (19.6)	4 (7.8)	1 (2.0)		51 (100.0)	3	54	10.10	1.47	
私立大学 (%)	1 (0.4)			7 (3.0)	9 (3.9)	26 (11.2)	67 (28.8)	73 (31.3)	38 (16.3)	9 (3.9)	3 (1.3)	233 (100.0)	4	237	10.97	1.37	
国立病院機構等 (%)	1 (1.9)			1 (1.9)	5 (9.6)	7 (13.5)	18 (34.6)	15 (28.8)	3 (5.8)		2 (3.8)	52 (100.0)	3	55	10.48	1.50	
県市町村立・国保 (%)			8 (0.3)	40 (1.6)	103 (4.2)	350 (14.4)	699 (28.8)	762 (31.4)	331 (13.6)	89 (3.7)	46 (1.9)	2,428 (100.0)	130	2,558	10.93	1.34	
JCHO(旧社会保険)等 (%)	1 (0.2)	1 (0.2)		12 (2.3)	22 (4.2)	75 (14.5)	188 (36.2)	149 (28.7)	57 (11.0)	13 (2.5)	1 (0.2)	519 (100.0)	7	526	10.73	1.22	
厚生連等 (%)			3 (0.2)	17 (1.2)	46 (3.2)	192 (13.4)	442 (30.8)	445 (31.0)	194 (13.5)	70 (4.9)	27 (1.9)	1,436 (100.0)	35	1,471	11.01	1.29	
その他公的 (%)	1 (0.1)			5 (0.5)	15 (1.5)	46 (4.5)	145 (14.2)	292 (28.5)	298 (29.1)	144 (14.1)	55 (5.4)	22 (2.2)	1,023 (100.0)	59	1,082	10.97	1.38
私立総合 (%)		1 (0.1)	3 (0.2)	7 (0.5)	64 (0.5)	222 (4.7)	425 (16.2)	405 (31.1)	170 (29.6)	48 (12.4)	22 (3.5)	1,367 (100.0)	98	1,465	10.88	1.26	
私立 (%)	5 (0.0)	14 (0.1)	53 (0.3)	227 (1.3)	743 (4.3)	2,482 (14.2)	5,639 (32.3)	5,139 (29.5)	2,201 (12.6)	659 (3.8)	279 (1.6)	17,441 (100.0)	564	18,005	10.90	1.30	
私立診療所 (%)	23 (0.1)	20 (0.0)	75 (0.2)	281 (0.7)	1,377 (3.3)	5,738 (13.7)	14,519 (34.7)	13,069 (31.3)	4,873 (11.7)	1,307 (3.1)	536 (1.3)	41,818 (100.0)	1,103	42,921	10.91	1.19	
総計 (%)	30 (0.0)	38 (0.1)	148 (0.2)	609 (0.9)	2,427 (3.7)	9,241 (13.9)	22,306 (33.6)	20,365 (30.7)	8,015 (12.1)	2,251 (3.4)	938 (1.4)	66,368 (100.0)	2,006	68,374	10.91	1.24	

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D4334##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査