

表 1236 ヘモグロビン濃度(g/dL) 性別 (腹膜透析患者)

性別	5未満	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	1 (0.0)	5 (0.1)	8 (0.2)	56 (1.5)	174 (4.6)	548 (14.5)	1,007 (26.7)	1,170 (31.1)	549 (14.6)	180 (4.8)	69 (1.8)	3,767 (100.0)	1,835	5,602	10.97	1.37
女性 (%)	2 (0.1)	2 (0.1)	7 (0.3)	39 (1.9)	109 (5.4)	296 (14.6)	591 (29.2)	623 (30.8)	260 (12.9)	73 (3.6)	20 (1.0)	2,022 (100.0)	991	3,013	10.82	1.33
合計 (%)	3 (0.1)	7 (0.1)	15 (0.3)	95 (1.6)	283 (4.9)	844 (14.6)	1,598 (27.6)	1,793 (31.0)	809 (14.0)	253 (4.4)	89 (1.5)	5,789 (100.0)	2,826	8,615	10.92	1.36
記載なし (%)																
総計 (%)	3 (0.1)	7 (0.1)	15 (0.3)	95 (1.6)	283 (4.9)	844 (14.6)	1,598 (27.6)	1,793 (31.0)	809 (14.0)	253 (4.4)	89 (1.5)	5,789 (100.0)	2,826	8,615	10.92	1.36

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

#D4340##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査