

表 1237 ヘモグロビン濃度(g/dL) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	5未満	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)					6 (9.8)	9 (14.8)	7 (11.5)	22 (36.1)	8 (13.1)	6 (9.8)	3 (4.9)	61 (100.0)	24	85	11.17	1.67
15歳~ (%)					2 (3.2)	9 (14.5)	12 (19.4)	22 (35.5)	12 (19.4)	4 (6.5)	1 (1.6)	62 (100.0)	32	94	11.18	1.35
30歳~ (%)			2 (0.5)	8 (2.0)	25 (6.2)	60 (14.9)	107 (26.5)	115 (28.5)	49 (12.1)	24 (5.9)	14 (3.5)	404 (100.0)	204	608	10.96	1.51
45歳~ (%)	1 (0.1)	3 (0.2)	2 (0.1)	29 (1.9)	74 (4.8)	215 (14.1)	418 (27.3)	462 (30.2)	220 (14.4)	70 (4.6)	36 (2.4)	1,530 (100.0)	753	2,283	10.96	1.43
60歳~ (%)	2 (0.1)	3 (0.1)	10 (0.4)	35 (1.4)	109 (4.3)	359 (14.2)	715 (28.2)	816 (32.2)	358 (14.1)	105 (4.1)	24 (0.9)	2,536 (100.0)	1,182	3,718	10.92	1.31
75歳~ (%)		1 (0.1)	1 (0.1)	22 (2.0)	64 (5.7)	181 (16.1)	313 (27.9)	335 (29.9)	153 (13.6)	41 (3.7)	10 (0.9)	1,121 (100.0)	580	1,701	10.82	1.30
90歳~ (%)				1 (1.3)	3 (4.0)	11 (14.7)	26 (34.7)	21 (28.0)	9 (12.0)	3 (4.0)	1 (1.3)	75 (100.0)	51	126	10.92	1.25
合計 (%)	3 (0.1)	7 (0.1)	15 (0.3)	95 (1.6)	283 (4.9)	844 (14.6)	1,598 (27.6)	1,793 (31.0)	809 (14.0)	253 (4.4)	89 (1.5)	5,789 (100.0)	2,826	8,615	10.92	1.36
不明 (%)																
記載なし (%)																
総計 (%)	3 (0.1)	7 (0.1)	15 (0.3)	95 (1.6)	283 (4.9)	844 (14.6)	1,598 (27.6)	1,793 (31.0)	809 (14.0)	253 (4.4)	89 (1.5)	5,789 (100.0)	2,826	8,615	10.92	1.36
平均	62.33	61.86	61.20	63.78	62.56	63.43	63.94	62.90	63.08	60.43	55.89	63.07	63.34	63.16		
標準偏差	3.79	12.40	11.60	13.93	16.32	14.68	13.53	14.39	14.37	16.16	16.26	14.43	14.60	14.48		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D4341##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査