

表 1238 ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	5未満	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差	
2年未満	1 (%)	3 (0.0)	8 (0.1)	52 (0.3)	129 (2.1)	387 (5.3)	641 (15.9)	740 (26.4)	337 (30.4)	109 (13.9)	25 (4.5)	2,432 (1.0)	1,186 (100.0)	3,618	10.86	1.38	
2年~	2 (%)	1 (0.1)	4 (0.1)	28 (0.2)	90 (1.4)	267 (4.6)	558 (13.5)	590 (28.2)	315 (29.8)	91 (15.9)	32 (4.6)	1,978 (1.6)	1,006 (100.0)	2,984	10.98	1.34	
5年~		2 (%)	3 (0.2)	10 (0.3)	45 (0.9)	145 (4.2)	316 (13.6)	359 (29.7)	122 (33.7)	44 (11.5)	19 (4.1)	1,065 (1.8)	510 (100.0)	1,575	10.93	1.30	
10年~		1 (%)		4 (0.5)	12 (1.9)	30 (5.7)	54 (14.2)	71 (25.5)	25 (33.5)	6 (11.8)	9 (2.8)	212 (4.2)	77 (100.0)	289	10.96	1.48	
15年~				1 (1.5)	3 (4.6)	10 (15.4)	19 (29.2)	21 (32.3)	6 (9.2)	2 (3.1)	3 (4.6)	65 (100.0)	20 (100.0)	85	10.99	1.45	
20年~					2 (10.0)	4 (20.0)	5 (25.0)	7 (35.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	1 (5.0)	20 (100.0)	8 (100.0)	28	10.72	1.30	
25年~						1 (20.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	2 (40.0)			1 (20.0)	5 (100.0)	4 (100.0)	9	11.34	2.01
30年~						1 (25.0)		2 (50.0)	1 (50.0)	1 (25.0)			4 (100.0)	2 (100.0)	6	11.08	1.74
35年~							1 (100.0)						1 (100.0)	1 (100.0)	1	10.50	
40年~						1 (50.0)			1 (50.0)				2 (100.0)	2 (100.0)	2	10.30	2.69
合計	3 (%)	7 (0.1)	15 (0.3)	95 (1.6)	283 (4.9)	844 (14.6)	1,595 (27.6)	1,792 (31.0)	808 (14.0)	253 (4.4)	89 (1.5)	5,784 (100.0)	2,813 (100.0)	8,597	10.92	1.36	
不明								3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)			5 (100.0)	13 (100.0)	18	11.20	0.92
記載なし																	
総計	3 (%)	7 (0.1)	15 (0.3)	95 (1.6)	283 (4.9)	844 (14.6)	1,598 (27.6)	1,793 (31.0)	809 (14.0)	253 (4.4)	89 (1.5)	5,789 (100.0)	2,826 (100.0)	8,615	10.92	1.36	
平均	1.67	4.14	2.53	2.42	3.14	2.96	3.13	3.21	2.88	2.74	4.47	3.09	2.90	3.03			
標準偏差	1.53	3.89	2.53	3.21	4.54	3.64	3.49	3.65	3.49	3.08	4.79	3.63	3.28	3.52			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D4342##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査