

表 1239 ヘモグロビン濃度(g/dL) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1 (0.1)	2 (0.1)	4 (0.2)	25 (1.4)	90 (4.9)	221 (12.1)	529 (28.9)	609 (33.2)	248 (13.5)	74 (4.0)	29 (1.6)	1,832 (100.0)	834	2,666	10.97	1.32
慢性腎盂腎炎 (%)		1 (1.4)		1 (1.4)	8 (10.8)	16 (21.6)	14 (18.9)	21 (28.4)	10 (13.5)	3 (4.1)		74 (100.0)	23	97	10.52	1.42
急速進行性糸球体腎炎 (%)					2 (4.5)	11 (25.0)	8 (18.2)	15 (34.1)	6 (13.6)	2 (4.5)		44 (100.0)	17	61	10.83	1.28
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)						3 (15.0)	6 (30.0)	9 (45.0)	2 (10.0)			20 (100.0)	4	24	10.96	0.83
その他の分類不能の腎炎 (%)				1 (1.9)	5 (9.4)	4 (7.5)	11 (20.8)	19 (35.8)	8 (15.1)	4 (7.5)	1 (1.9)	53 (100.0)	22	75	11.03	1.44
多発性嚢胞腎 (%)				1 (0.6)	3 (1.7)	20 (11.2)	52 (29.1)	58 (32.4)	26 (14.5)	13 (7.3)	6 (3.4)	179 (100.0)	93	272	11.25	1.40
腎硬化症 (%)				15 (2.0)	33 (4.4)	101 (13.5)	226 (30.2)	212 (28.3)	121 (16.2)	30 (4.0)	10 (1.3)	748 (100.0)	358	1,106	10.95	1.30
悪性高血圧 (%)					5 (7.5)	14 (20.9)	17 (25.4)	20 (29.9)	8 (11.9)	3 (4.5)		67 (100.0)	39	106	10.74	1.22
糖尿病性腎症 (%)	2 (0.1)	2 (0.1)	6 (0.3)	32 (1.7)	86 (4.7)	320 (17.4)	498 (27.1)	522 (28.4)	259 (14.1)	82 (4.5)	26 (1.4)	1,835 (100.0)	911	2,746	10.87	1.38
SLE腎炎 (%)				3 (9.4)	3 (9.4)	3 (9.4)	9 (28.1)	7 (21.9)	4 (12.5)	3 (9.4)		32 (100.0)	23	55	10.57	1.66
アミロイド腎 (%)					2 (18.2)	3 (27.3)	1 (9.1)	3 (27.3)	2 (18.2)			11 (100.0)	5	16	10.51	1.40
痛風腎 (%)					1 (6.3)		4 (25.0)	9 (56.3)	1 (6.3)		1 (6.3)	16 (100.0)	7	23	11.32	1.17
先天性代謝異常による腎不全 (%)				1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	3 (25.0)	5 (41.7)	2 (16.7)			12 (100.0)	5	17	10.88	1.13
腎・尿路結核 (%)													1	1		
腎・尿路結石 (%)						4 (25.0)	4 (25.0)	6 (37.5)	1 (6.3)	1 (6.3)		16 (100.0)	5	21	10.73	1.02
腎・尿路腫瘍 (%)				1 (12.5)	1 (12.5)	1 (12.5)	3 (37.5)	2 (25.0)	1 (12.5)			8 (100.0)	4	12	11.19	1.59
閉塞性尿路障害 (%)						1 (8.3)	3 (25.0)	7 (58.3)	1 (8.3)			12 (100.0)	8	20	10.99	0.81
骨髄腫 (%)				2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)				1 (20.0)		5 (100.0)	2	7	9.30	2.78
腎形成不全 (%)		1 (2.3)			1 (2.3)	4 (9.3)	5 (11.6)	16 (37.2)	8 (18.6)	3 (7.0)	5 (11.6)	43 (100.0)	22	65	11.51	1.72
不明 (%)		1 (0.2)	4 (0.7)	14 (2.5)	31 (5.4)	75 (13.2)	166 (29.2)	188 (33.0)	65 (11.4)	20 (3.5)	5 (0.9)	569 (100.0)	320	889	10.81	1.38
再導入 (%)				1 (2.0)	1 (2.0)	13 (26.5)	14 (28.6)	13 (26.5)	5 (10.2)	2 (4.1)		49 (100.0)	16	65	10.74	1.21
その他 (%)			1 (0.6)		9 (5.5)	28 (17.1)	28 (17.1)	51 (31.1)	30 (18.3)	11 (6.7)	6 (3.7)	164 (100.0)	107	271	11.12	1.51
合計 (%)	3 (0.1)	7 (0.1)	15 (0.3)	95 (1.6)	283 (4.9)	844 (14.6)	1,598 (27.6)	1,793 (31.0)	809 (14.0)	253 (4.4)	89 (1.5)	5,789 (100.0)	2,826	8,615	10.92	1.36
記載なし (%)																
総計 (%)	3 (0.1)	7 (0.1)	15 (0.3)	95 (1.6)	283 (4.9)	844 (14.6)	1,598 (27.6)	1,793 (31.0)	809 (14.0)	253 (4.4)	89 (1.5)	5,789 (100.0)	2,826	8,615	10.92	1.36

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4343##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査