

表 1248 総コレステロール濃度(mg/dL) 医療機関別 (透析患者全体)

医療機関	100未満	100 ~	120 ~	140 ~	160 ~	180 ~	200 ~	220 ~	240 ~	260 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	21	50	71	83	74	61	40	36	17	10	463	661	1,124	165.27	43.97
(%)	(4.5)	(10.8)	(15.3)	(17.9)	(16.0)	(13.2)	(8.6)	(7.8)	(3.7)	(2.2)	(100.0)				
私立大学	63	141	282	380	327	261	140	71	45	38	1,748	1,938	3,686	163.91	40.46
(%)	(3.6)	(8.1)	(16.1)	(21.7)	(18.7)	(14.9)	(8.0)	(4.1)	(2.6)	(2.2)	(100.0)				
国立病院機構等	19	56	81	115	88	67	42	18	9	16	511	400	911	161.96	41.84
(%)	(3.7)	(11.0)	(15.9)	(22.5)	(17.2)	(13.1)	(8.2)	(3.5)	(1.8)	(3.1)	(100.0)				
県市町村立・国保	594	1,610	2,689	3,031	2,279	1,408	806	347	148	157	13,069	6,679	19,748	154.02	37.66
(%)	(4.5)	(12.3)	(20.6)	(23.2)	(17.4)	(10.8)	(6.2)	(2.7)	(1.1)	(1.2)	(100.0)				
JCHO(旧社会保険)等	114	316	552	630	587	359	224	98	45	31	2,956	809	3,765	158.29	37.73
(%)	(3.9)	(10.7)	(18.7)	(21.3)	(19.9)	(12.1)	(7.6)	(3.3)	(1.5)	(1.0)	(100.0)				
厚生連等	297	758	1,355	1,557	1,282	824	463	198	109	66	6,909	2,476	9,385	156.06	37.41
(%)	(4.3)	(11.0)	(19.6)	(22.5)	(18.6)	(11.9)	(6.7)	(2.9)	(1.6)	(1.0)	(100.0)				
その他公的	265	722	1,378	1,590	1,281	832	474	248	88	70	6,948	3,910	10,858	157.01	37.12
(%)	(3.8)	(10.4)	(19.8)	(22.9)	(18.4)	(12.0)	(6.8)	(3.6)	(1.3)	(1.0)	(100.0)				
私立総合	325	629	1,082	1,313	1,050	679	387	171	53	58	5,747	2,066	7,813	154.71	38.41
(%)	(5.7)	(10.9)	(18.8)	(22.8)	(18.3)	(11.8)	(6.7)	(3.0)	(0.9)	(1.0)	(100.0)				
私立	3,363	8,161	14,130	15,834	12,872	8,280	4,237	2,027	813	539	70,256	21,333	91,589	154.25	36.53
(%)	(4.8)	(11.6)	(20.1)	(22.5)	(18.3)	(11.8)	(6.0)	(2.9)	(1.2)	(0.8)	(100.0)				
私立診療所	3,697	12,556	24,794	29,604	25,632	16,798	9,007	3,970	1,651	1,124	128,833	41,397	170,230	158.31	35.60
(%)	(2.9)	(9.7)	(19.2)	(23.0)	(19.9)	(13.0)	(7.0)	(3.1)	(1.3)	(0.9)	(100.0)				
総計	8,758	24,999	46,414	54,137	45,472	29,569	15,820	7,184	2,978	2,109	237,440	81,669	319,109	156.74	36.32
(%)	(3.7)	(10.5)	(19.5)	(22.8)	(19.2)	(12.5)	(6.7)	(3.0)	(1.3)	(0.9)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4417##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査