

表 1252 総コレステロール濃度(mg/dL) 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

原疾患	100未満	100~	120~	140~	160~	180~	200~	220~	240~	260~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎	1,357 (%)	4,002 (8.8)	8,296 (18.2)	10,556 (23.1)	9,283 (20.3)	6,312 (13.8)	3,374 (7.4)	1,530 (3.3)	597 (1.3)	391 (0.9)	45,698 (100.0)	11,474	57,172	159.67	35.63
慢性腎盂腎炎	46 (%)	113 (3.0)	240 (7.5)	342 (15.9)	311 (22.6)	215 (20.6)	145 (14.2)	56 (9.6)	27 (3.7)	18 (1.8)	1,513 (1.2)	355	1,868	163.15	37.12
急速進行性糸球体腎炎	22 (%)	85 (1.7)	184 (6.4)	240 (13.8)	275 (18.0)	189 (20.6)	175 (14.2)	81 (13.1)	43 (6.1)	38 (2.9)	1,332 (3.2)	355	1,687	172.93	41.37
妊娠腎/妊娠中毒症	6 (%)	37 (0.9)	86 (5.4)	108 (12.6)	154 (15.8)	133 (22.5)	74 (19.4)	48 (10.8)	20 (7.0)	18 (2.9)	684 (2.6)	165	849	174.89	38.44
その他の分類不能の腎炎	20 (%)	69 (2.7)	124 (9.4)	172 (16.9)	152 (23.4)	93 (20.7)	63 (12.7)	25 (8.6)	11 (3.4)	5 (1.5)	734 (0.7)	168	902	160.07	36.64
多発性囊胞腎	130 (%)	469 (2.1)	1,044 (7.7)	1,385 (17.2)	1,330 (22.8)	907 (21.9)	497 (14.9)	201 (8.2)	70 (3.3)	42 (1.2)	6,075 (0.7)	1,473	7,548	161.66	34.27
腎硬化症	550 (%)	1,776 (3.2)	3,589 (10.2)	4,192 (20.7)	3,351 (24.1)	2,086 (19.3)	1,039 (12.0)	466 (6.0)	179 (2.7)	131 (1.0)	17,359 (0.8)	4,159	21,518	155.72	34.75
悪性高血圧	31 (%)	112 (2.2)	267 (8.1)	310 (19.2)	289 (22.3)	207 (20.8)	94 (14.9)	49 (6.8)	18 (3.5)	14 (1.3)	1,391 (1.0)	386	1,777	160.55	35.05
糖尿病性腎症	3,619 (%)	9,362 (5.4)	15,051 (13.9)	15,476 (22.3)	11,383 (22.9)	6,749 (16.9)	3,290 (10.0)	1,446 (4.9)	620 (2.1)	468 (0.9)	67,464 (0.7)	17,004	84,468	150.01	35.62
SLE腎炎	19 (%)	69 (1.7)	172 (6.2)	216 (15.5)	230 (19.4)	155 (20.7)	128 (13.9)	71 (11.5)	29 (6.4)	23 (2.6)	1,112 (2.1)	258	1,370	169.92	39.50
アミロイド腎	6 (%)	20 (2.8)	42 (9.3)	47 (19.5)	38 (21.9)	33 (17.7)	15 (15.3)	7 (7.0)	4 (3.3)	3 (1.9)	215 (1.4)	65	280	160.12	38.25
痛風腎	29 (%)	47 (5.2)	117 (8.4)	134 (20.8)	117 (23.8)	65 (20.8)	31 (11.6)	8 (5.5)	9 (1.4)	5 (1.6)	562 (0.9)	138	700	154.85	34.90
先天性代謝異常による腎不全	5 (%)	10 (3.8)	24 (7.7)	36 (18.5)	22 (27.7)	9 (16.9)	13 (6.9)	3 (10.0)	3 (2.3)	5 (2.3)	130 (3.8)	39	169	161.27	42.67
腎・尿路結核	2 (%)	8 (2.4)	20 (9.8)	19 (24.4)	11 (23.2)	5 (13.4)	5 (6.1)	10 (12.2)	6 (7.3)	1 (1.2)	82 (100.0)	24	106	159.43	38.39
腎・尿路結石	13 (%)	25 (4.2)	60 (8.1)	75 (19.4)	68 (24.2)	38 (21.9)	24 (12.3)	3 (7.7)	1 (1.0)	3 (0.3)	310 (1.0)	74	384	156.28	34.25
腎・尿路腫瘍	20 (%)	50 (3.9)	124 (9.7)	123 (23.9)	100 (23.7)	48 (19.3)	29 (9.3)	16 (5.6)	5 (3.1)	3 (1.0)	518 (0.6)	126	644	153.45	34.30
閉塞性尿路障害	4 (%)	34 (1.1)	71 (9.2)	83 (19.2)	77 (22.4)	49 (20.8)	33 (13.2)	13 (8.9)	3 (3.5)	3 (0.8)	370 (0.8)	95	465	160.55	34.07
骨髄腫	7 (%)	13 (4.5)	29 (8.4)	30 (18.7)	25 (19.4)	22 (16.1)	13 (14.2)	13 (8.4)	6 (3.9)	6 (2.6)	155 (3.9)	58	213	164.49	47.20
腎形成不全	5 (%)	19 (1.7)	61 (6.6)	58 (21.0)	55 (20.0)	57 (19.0)	57 (19.7)	25 (8.6)	6 (2.1)	2 (0.7)	290 (0.7)	78	368	162.00	35.99
不明	522 (%)	1,649 (3.3)	3,067 (10.4)	3,665 (19.4)	3,092 (23.1)	1,970 (19.5)	1,092 (12.4)	473 (6.9)	176 (3.0)	133 (1.1)	15,839 (0.8)	4,639	20,478	156.96	35.76
再導入	30 (%)	76 (3.1)	163 (7.8)	212 (16.8)	202 (21.8)	140 (20.8)	81 (14.4)	37 (8.3)	16 (3.8)	14 (1.6)	971 (1.4)	193	1,164	162.65	37.07
その他	184 (%)	405 (4.3)	757 (9.6)	925 (17.9)	843 (21.9)	532 (19.9)	317 (12.6)	140 (7.5)	81 (3.3)	48 (1.9)	4,232 (1.1)	1,174	5,406	158.87	38.31
合計	6,627 (%)	18,450 (4.0)	33,588 (11.0)	38,404 (20.1)	31,408 (23.0)	20,014 (18.8)	10,562 (12.0)	4,691 (6.3)	1,913 (2.8)	1,379 (1.1)	167,036 (0.8)	42,500	209,536	155.42	36.05
記載なし															
総計	6,627 (%)	18,450 (4.0)	33,588 (11.0)	38,404 (20.1)	31,408 (23.0)	20,014 (18.8)	10,562 (12.0)	4,691 (6.3)	1,913 (2.8)	1,379 (1.1)	167,036 (0.8)	42,500	209,536	155.42	36.05

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4423##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査