

表 1259 総コレステロール濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	50	188	413	611	657	490	291	153	54	48	2,955	2,647	5,602	168.46	37.94
(%)	(1.7)	(6.4)	(14.0)	(20.7)	(22.2)	(16.6)	(9.8)	(5.2)	(1.8)	(1.6)	(100.0)				
女性	10	29	92	204	292	323	235	181	100	107	1,573	1,440	3,013	192.97	42.44
(%)	(0.6)	(1.8)	(5.8)	(13.0)	(18.6)	(20.5)	(14.9)	(11.5)	(6.4)	(6.8)	(100.0)				
合計	60	217	505	815	949	813	526	334	154	155	4,528	4,087	8,615	176.97	41.25
(%)	(1.3)	(4.8)	(11.2)	(18.0)	(21.0)	(18.0)	(11.6)	(7.4)	(3.4)	(3.4)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	60	217	505	815	949	813	526	334	154	155	4,528	4,087	8,615	176.97	41.25
(%)	(1.3)	(4.8)	(11.2)	(18.0)	(21.0)	(18.0)	(11.6)	(7.4)	(3.4)	(3.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4440##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査