

表 1261 総コレステロール濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	100未満	100~	120~	140~	160~	180~	200~	220~	240~	260~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	18	79	198	335	385	333	208	150	65	73	1,844	1,774	3,618	178.51	40.85
(%)	(1.0)	(4.3)	(10.7)	(18.2)	(20.9)	(18.1)	(11.3)	(8.1)	(3.5)	(4.0)	(100.0)				
2年~	21	76	175	264	322	265	195	112	55	48	1,533	1,451	2,984	176.99	41.66
(%)	(1.4)	(5.0)	(11.4)	(17.2)	(21.0)	(17.3)	(12.7)	(7.3)	(3.6)	(3.1)	(100.0)				
5年~	11	49	99	157	189	172	94	53	23	22	869	706	1,575	174.42	40.06
(%)	(1.3)	(5.6)	(11.4)	(18.1)	(21.7)	(19.8)	(10.8)	(6.1)	(2.6)	(2.5)	(100.0)				
10年~	5	8	18	47	40	26	16	11	5	8	184	105	289	172.99	43.52
(%)	(2.7)	(4.3)	(9.8)	(25.5)	(21.7)	(14.1)	(8.7)	(6.0)	(2.7)	(4.3)	(100.0)				
15年~	3	2	8	6	7	11	9	5	5	3	59	26	85	183.47	48.02
(%)	(5.1)	(3.4)	(13.6)	(10.2)	(11.9)	(18.6)	(15.3)	(8.5)	(8.5)	(5.1)	(100.0)				
20年~	1	1	6	2	3	3		1	1		18	10	28	159.89	39.87
(%)	(5.6)	(5.6)	(33.3)	(11.1)	(16.7)	(16.7)		(5.6)	(5.6)		(100.0)				
25年~		1			1	2		1			5	4	9	177.20	41.05
(%)		(20.0)			(20.0)	(40.0)		(20.0)			(100.0)				
30年~						1	2	1			4	2	6	212.50	19.84
(%)						(25.0)	(50.0)	(25.0)			(100.0)				
35年~				1							1		1	157.00	
(%)				(100.0)							(100.0)				
40年~							2				2		2	211.00	4.24
(%)							(100.0)				(100.0)				
合計	59	216	504	812	947	813	526	334	154	154	4,519	4,078	8,597	177.01	41.21
(%)	(1.3)	(4.8)	(11.2)	(18.0)	(21.0)	(18.0)	(11.6)	(7.4)	(3.4)	(3.4)	(100.0)				
不明	1	1	1	3	2					1	9	9	18	158.78	57.91
(%)	(11.1)	(11.1)	(11.1)	(33.3)	(22.2)					(11.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	60	217	505	815	949	813	526	334	154	155	4,528	4,087	8,615	176.97	41.25
(%)	(1.3)	(4.8)	(11.2)	(18.0)	(21.0)	(18.0)	(11.6)	(7.4)	(3.4)	(3.4)	(100.0)				
平均	4.68	3.51	3.32	3.27	3.13	3.27	3.32	3.06	3.13	3.08	3.26	2.77	3.03		
標準偏差	4.97	3.80	3.85	3.70	3.42	3.83	4.34	3.94	4.03	3.58	3.81	3.14	3.52		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4442##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査