

表 1263 総コレステロール濃度(mg/dL) 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	100未満	100 ~	120 ~	140 ~	160 ~	180 ~	200 ~	220 ~	240 ~	260 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	1	5	18	31	38	38	28	25	13	7	204	352	556	186.25	39.58
(%)	(0.5)	(2.5)	(8.8)	(15.2)	(18.6)	(18.6)	(13.7)	(12.3)	(6.4)	(3.4)	(100.0)				
私立大学	3	15	50	72	91	89	57	31	21	16	445	704	1,149	180.06	39.75
(%)	(0.7)	(3.4)	(11.2)	(16.2)	(20.4)	(20.0)	(12.8)	(7.0)	(4.7)	(3.6)	(100.0)				
国立病院機構等	4	3	16	21	25	20	18	12	6	8	133	94	227	182.41	45.05
(%)	(3.0)	(2.3)	(12.0)	(15.8)	(18.8)	(15.0)	(13.5)	(9.0)	(4.5)	(6.0)	(100.0)				
県市町村立・国保	14	50	117	171	176	154	126	63	26	40	937	663	1,600	176.54	43.67
(%)	(1.5)	(5.3)	(12.5)	(18.2)	(18.8)	(16.4)	(13.4)	(6.7)	(2.8)	(4.3)	(100.0)				
JCHO(旧社会保険)等	1	8	15	16	28	24	17	8	7	3	127	369	496	178.21	40.84
(%)	(0.8)	(6.3)	(11.8)	(12.6)	(22.0)	(18.9)	(13.4)	(6.3)	(5.5)	(2.4)	(100.0)				
厚生連等	4	15	45	67	66	52	33	27	8	12	329	222	551	174.33	40.87
(%)	(1.2)	(4.6)	(13.7)	(20.4)	(20.1)	(15.8)	(10.0)	(8.2)	(2.4)	(3.6)	(100.0)				
その他公的	9	43	66	141	164	133	76	57	24	29	742	585	1,327	177.51	42.73
(%)	(1.2)	(5.8)	(8.9)	(19.0)	(22.1)	(17.9)	(10.2)	(7.7)	(3.2)	(3.9)	(100.0)				
私立総合	6	17	30	63	71	64	30	18	11	8	318	75	393	174.03	39.05
(%)	(1.9)	(5.3)	(9.4)	(19.8)	(22.3)	(20.1)	(9.4)	(5.7)	(3.5)	(2.5)	(100.0)				
私立	14	34	95	156	175	149	87	63	26	21	820	806	1,626	175.51	40.58
(%)	(1.7)	(4.1)	(11.6)	(19.0)	(21.3)	(18.2)	(10.6)	(7.7)	(3.2)	(2.6)	(100.0)				
私立診療所	4	27	53	77	115	90	54	30	12	11	473	217	690	174.60	37.11
(%)	(0.8)	(5.7)	(11.2)	(16.3)	(24.3)	(19.0)	(11.4)	(6.3)	(2.5)	(2.3)	(100.0)				
総計	60	217	505	815	949	813	526	334	154	155	4,528	4,087	8,615	176.97	41.25
(%)	(1.3)	(4.8)	(11.2)	(18.0)	(21.0)	(18.0)	(11.6)	(7.4)	(3.4)	(3.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4444##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査